



รายงานผล การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

พ.ศ. 2561

รายงานผล
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
พ.ศ. 2561

โครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561 (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-3925-4

ที่ปรึกษาโครงการ

- | | |
|--|--|
| 1. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย | อธิบดีกรมควบคุมโรค |
| 2. นายแพทย์อัมฤงค์ รวยอาจิณ | รองอธิบดีกรมควบคุมโรค |
| 3. แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ |
| 4. นายแพทย์ไพฑูริ์ สิงห์คำ | หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและระบาดวิทยา |

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ดร. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

นางสาวนิภาพร เหลืองทอง

หนังสือ	รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561
คำสำคัญ	การสำรวจ พฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
บรรณาธิการ	ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
จัดพิมพ์โดย	สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ที่	สำนักพิมพ์อักษรกราฟิกแอนดี้ดีไซน์
พิมพ์ครั้งที่ 1	พ.ศ. 2561 จำนวน 700 เล่ม



สารผู้บริหารกรมควบคุมโรค

โรคไม่ติดต่อ เป็นความท้าทายของกรมควบคุมโรคที่จะบรรลุถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก 6 วัตถุประสงค์คือ การประสานความร่วมมือของหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกระดับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และระบบสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การประเมินแผนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการติดตาม-การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้วยระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรค ลดโรค และภัยสุขภาพ ให้การดูแลสุขภาพของประชาชน ปลอดภัยและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียม

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นระบบการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ สำหรับติดตามสุขอนามัยประชาชนในการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลการสำรวจที่ได้เป็นประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระบบสุขภาพทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และระดับนานาชาติ

จึงขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับทุนสนับสนุนการดำเนินการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561

(นายสุวรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สารบัญ

สารผู้บริหาร	3
สารบัญ	4
บทสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561	6
ส่วนที่ 1 รายงานผลการสำรวจฯ ภาพรวมสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยง สถานะสุขภาพและการได้รับบริการสุขภาพสำคัญระดับประเทศ	7
ส่วนที่ 2 รายงานผลการสำรวจฯ ด้วยดัชนีสุขภาพการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อสำคัญจำแนกรายจังหวัดสำรวจฯ 21 จังหวัด	14
ส่วนที่ 3 ตารางรายงานผลการสำรวจประเด็นสำคัญและประเด็นใหม่ในการสำรวจฯ พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 4-11)	58
รายชื่อคณะทำงานโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561	67

สารบัญรูป

รูปที่ 1	ประมาณการความชุกผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15-79 ปี พ.ศ. 2561	8
รูปที่ 2	ประมาณการความชุกผู้มีกิจกรรมทางกายในประชากรอายุ 15-79 ปี พ.ศ. 2561	9

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	ค่าประมาณความชุกปัจจัยเสี่ยงในประชากรอายุ 15-79 ปี	11
ตารางที่ 2	ค่าประมาณการความชุกสถานะสุขภาพในประชากรอายุ 15-79 ปี	12
ตารางที่ 3	ค่าประมาณการความชุกผู้รับบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี	13
ตารางที่ 4	ค่าประมาณความชุกผู้มีกิจกรรมทางกายหรือได้ออกกำลังกายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมิน 2011 BRFSS Physical Activity Questions)	58
ตารางที่ 5	ค่าประมาณความชุกผู้มีความเครียดใน 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมินความเครียด ST-5)	59
ตารางที่ 6	ค่าประมาณความชุกผู้มีภาวะซึมเศร้าใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q)	60
ตารางที่ 7	ค่าประมาณความชุกโรคไม่ติดต่อสำคัญ ในประชากรอายุ 15-79 ปี	61
ตารางที่ 8	ค่าประมาณความชุกผู้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขีรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี	63
ตารางที่ 9	ค่าประมาณความชุกผู้สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี	64
ตารางที่ 10	ค่าประมาณความชุกผู้คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี	65
ตารางที่ 11	ค่าประมาณความชุกผู้คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้าคู่กับคนขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี	66



ผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561



กว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาหลายการศึกษาได้ผลเป็นที่ประจักษ์ว่าพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลายหลากหลาย ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหาร การมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย อารมณ์ ความเครียด ปัญหาทางด้านจิตใจ หรือปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์ อายุ เพศ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมทั้งความเป็นเมืองและ พัฒนาการทางสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตให้แตกต่างไป จากเดิม ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บมากขึ้นตามลำดับจนเข้าสู่ยุคของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยิ่งกว่านั้นธรรมชาติ ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ซับซ้อน ก็เพิ่มข้อปฏิบัติและข้อกำหนดในการจัดระบบบริการสุขภาพทั้งการป้องกันควบคุมโรคและ การรักษาโรคมากยิ่งขึ้น การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อก็เช่นเดียวกันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความสำคัญของระบบป้องกันควบคุมโรค สำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและความชุกโรคไม่ติดต่อ เพื่อประเมินสถานการณ์และ ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อ ทำนายคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โครงการการสำรวจพฤติกรรม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จึงได้ริเริ่มขึ้นในปี 2547 พัฒนผ่านยุคสมัยของการเก็บข้อมูลด้วยกระดาษเป็นการเก็บข้อมูล ออนไลน์ ได้ปรับขบวนการสุ่มตัวอย่างให้รวดเร็ว เหมาะสม และเป็นจริงมากขึ้นเป็นลำดับ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลสำรวจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561 ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรค ไม่ติดต่อด้วยออกแบบการสำรวจระดับจังหวัด แสดงสถานะทางสุขภาพ ของประชาชน โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับการเก็บข้อมูลใน 21 จังหวัด สำรวจ และงบประมาณกรมควบคุมโรคสำหรับการวางระบบการสำรวจ ระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน ตุลาคม 2561 ประชากรเป้าหมายการสำรวจ มีอายุ 15-79 ปี การสุ่มหน่วยตัวอย่างเก็บข้อมูลสำหรับกรุงเทพมหานคร สุ่มเลือกแบบ Stratified four stage cluster sampling โดยกรอบเลือกหน่วยตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับ จังหวัดในภูมิภาค 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สระบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อุตรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครศรีธรรมราช สตูล ระนอง ตรัง สุ่มหน่วยตัวอย่างแบบ Stratified two stage cluster sampling โดยใช้กรอบรายชื่อประชากรจังหวัดจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพ จังหวัด (Provincial health data center) สำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่างเก็บข้อมูล ทำการประมาณการประชากรด้วยค่าคาด ประมาณจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 44,171 ราย เพศชาย 21,584 ราย เพศหญิง 22,587 ราย เพื่อประมาณการประชากรรวมของประเทศที่มีอายุ 15-79 ปี จำนวน 54,565,360 คน สร้างค่าถ่วงน้ำหนักประชากรแบบ Design weight และวิเคราะห์ผลแบบ Complex survey design ด้วยโปรแกรม SAS version 9.4 (Statistic Analysis System) ออกรายงานผลระดับประเทศและระดับจังหวัด บทสรุปผลการสำรวจพฤติกรรม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1** รายงานผลการสำรวจภาวะสุขภาพ สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยง สถานะสุขภาพ และการได้รับบริการสุขภาพสำคัญ ระดับประเทศ (ตารางที่ 1-3)
- ส่วนที่ 2** รายงานผลการสำรวจด้วยดัชนีสุขภาพการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อสำคัญ จำแนกรายจังหวัดสำรวจฯ 21 จังหวัด ตารางรายงานผลการสำรวจประเด็นสำคัญและประเด็นใหม่ในการสำรวจฯ พ.ศ. 2561 มี 6 ตารางคือ กิจกรรมทางกาย ความเครียด โรคซึมเศร้า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำคัญ การคาดเข็มขัดนิรภัยและการสวมหมวกนิรภัยขณะใช้ยานยนต์ (ตารางที่ 4-11)


ส่วนที่ 1 รายงานผลการสำรวจฯ ภาพรวมระดับประเทศ

ข้อมูลทางประชากร จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561 ในประชากรเป้าหมายอายุ 15-79 ปี ประเมินการสัดส่วนเพศหญิงเท่ากับ 51.4 สูงกว่าเพศชายเล็กน้อยเท่ากับ 48.6 ร้อยละ 39.6 อาศัยในเขตเทศบาล รวมกรุงเทพมหานคร และนอกเขตเทศบาล มีร้อยละ 60.4 ประกอบด้วย กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 17.9 อยู่ในวัยทำงานหรือกลุ่มอายุ 25-64 ปี มีร้อยละ 69.6 และกลุ่มอายุ 65 -79 ปี ร้อยละ 12.4 จากการประมาณการระดับการศึกษา พบว่า ไม่ได้รับการศึกษา ร้อยละ 2.6 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 4.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 37.8 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.6 ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 5.0 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 9.7 ส่วนระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบุคคล พบว่า ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 4,999 บาท ร้อยละ 34.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 9,999 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 24,999 บาท มีค่าใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 27.4 และร้อยละ 27.2 อีกร้อยละ 6.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

การศึกษาสูงสุด (%)	ชาย	หญิง	รวม	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (%)	ชาย	หญิง	รวม
ไม่ได้รับการศึกษา	1.8	3.6	2.6	ไม่มีรายได้	4.5	5.5	5.0
ต่ำกว่าประถมศึกษา	3.8	4.6	4.2	1-999 บาท	5.3	6.8	6.1
ประถมศึกษา	36.5	39.1	37.8	1,000 – 4,999 บาท	25.6	30.9	28.3
มัธยมศึกษาตอนต้น	22.4	18.2	20.2	5,000 – 9,999 บาท	27.9	27.0	27.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย	21.1	19.8	20.4	10,000 – 24,999 บาท	30.0	24.5	27.2
ปวส./ปศ.สูง/อนุปริญญา	5.7	4.4	5.0	25,000 – 49,999 บาท	5.3	4.4	4.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	8.8	10.6	9.7	ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป	1.5	1.0	1.3

ค่าประมาณความชุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรอายุ 15-79 ตามตารางที่ 1

ค่าดัชนีมวลกาย จากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงหน่วยตัวอย่าง พบมีความชุกภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) หรือผู้มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25.0-29.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร เท่ากับ 22.7 เพศหญิงพบความชุก 24.6 มากกว่าเพศชาย มีความชุกเท่ากับ 20.7 เช่นเดียวกับภาวะอ้วน (obesity) หรือผู้มีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับหรือมากกว่า 30.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร พบความชุกรวมเท่ากับ 7.8 เพศหญิงพบความชุก 9.4 สูงกว่าเพศชายพบความชุกเท่ากับ 6.1 ทั้งภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนมีความชุกเพิ่มขึ้นคล้ายคลึงกันคือ เมื่อกลุ่มอายุเพิ่มขึ้นหรือระดับรายได้สูงขึ้น พบแนวโน้มความชุกภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นตามลำดับ



รูปที่ 1 ประมาณการความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15-79 ปี พ.ศ. 2561

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ค่าประมาณความชุกเท่ากับ 16.8 หรือประมาณการมีผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน 8,801,704 คน เพศชายสูบบุหรี่ในปัจจุบันร้อยละ 32.6 หรือผู้ชาย 1 คนใน 3 คนมีการสูบบุหรี่ ขณะที่เพศหญิงพบความชุกเท่ากับ 2 หรือมีความชุกน้อยกว่าเพศชาย 16 เท่า เมื่อกลุ่มอายุเพิ่มสูงขึ้นหรือมีระดับการศึกษาสูงขึ้นพบแนวโน้มความชุกการสูบบุหรี่ในปัจจุบันลดลง นอกจากนี้พบความชุกผู้เลิกสูบบุหรี่ (ex-smoker) เท่ากับ 6.0 หรือประมาณการประชากรที่เลิกสูบบุหรี่มี 3,140,406 คน และใน 1 ปีที่ผ่านมาผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ร้อยละ 51.5 ได้พยายามหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วันเพราะอยากเลิกสูบบุหรี่ เพศหญิงมีความตั้งใจพยายามหยุดสูบบุหรี่เพื่อเลิกสูบบุหรี่ดังกล่าวร้อยละ 63.2 มากกว่าเพศชายพบร้อยละ 50.7 นอกจากนี้ผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันได้รายงานถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้เป็นประจำใน 30 วันที่ผ่านมาพบว่า ยาเส้น มากที่สุด ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ บุหรี่ซิการ์ ร้อยละ 29.7 บุหรี่มวนเอง ร้อยละ 20.5 ยาเส้นปรุง ร้อยละ 4.3 ยาฉุน ร้อยละ 1 บุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 0.3 และซิการ์ ร้อยละ 0.2 การสำรวจได้สอบถามถึงการเคยพบผู้สูบบุหรี่หรือเคยได้รับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ประกาศให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% จากหน่วยตัวอย่างทั้งหมดพบมีสัดส่วนแตกต่างกันตามลำดับดังนี้

1. ภายในที่พักอาศัย	40.7 %	5. ร้านอาหาร	34.0 %	9. สถานที่ราชการ	20.7 %
2. สถานที่ท่องเที่ยว	39.6 %	6. ป้ายรถเมล์	33.9 %	10. สถานพยาบาล	18.8 %
3. สวนสาธารณะ	36.3 %	7. สถานศึกษา	26.0 %		
4. ศาสนาสถาน	34.2 %	8. โรงแรม	22.7 %		


การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุกเท่ากับ 22.3 เพศชายมีความชุก 36.2 และเพศหญิงมีความชุก 9.4 มีลักษณะการดื่มแบบหนัก (Heavy drink) หรือมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานสำหรับเพศชาย หรือเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานสำหรับเพศหญิง มีความชุกรวมทั้งสองเพศเท่ากับ 5.9 เพศชายพบความชุก 11.3 และเพศหญิงมีความชุก 0.8 นอกจากนี้พบผู้เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานสำหรับเพศชาย หรือดื่มครั้งละมากกว่า 4 แก้วมาตรฐานสำหรับเพศหญิง ใน 30 วันที่ผ่านมา มีความชุก 9.6 สำหรับเพศชายมีความชุกนี้ 16.0 ส่วนเพศหญิงพบความชุก 3.6

การรับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ใน 7 วันที่ผ่านมา ค่าประมาณความชุกผู้ที่รับประทานผักหรือผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐาน เท่ากับ 33.0 เพศชายพบความชุก 30.9 และเพศหญิงพบความชุก 34.9 ในช่วงกลุ่มอายุ 35-64 ปี รับประทานผักและผลไม้ได้เพียงพอมากที่สุด เมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มความชุกลดลง สำหรับระดับการศึกษาและระดับรายได้ที่สูงขึ้นพบว่า มีแนวโน้มการรับประทานผักและผลไม้ได้เพียงพอสูงขึ้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมทางกายใน 30 วันที่ผ่านมา ประมาณประชากรอายุ 15-79 ปี มีลักษณะงานที่ทำเป็นปกติหรือมีกิจกรรมทางกายที่ทำเป็นปกติมีการใช้แรงหรือออกแรงที่แตกต่างกันดังนี้

งานที่ทำปกติมีลักษณะการใช้แรงหรือออกแรง	ชาย	หญิง	รวม
1. กลุ่มใช้แรงอย่างหนัก เช่น งานก่อสร้าง ทำไร่ ทำนา ยกของหนัก มากกว่าวันละ 4 ชั่วโมง	19.4	7.6	13.4
2. กลุ่มใช้แรงอย่างหนัก เช่น งานก่อสร้าง ทำไร่ ทำนา ยกของหนักน้อยกว่าวันละ 4 ชั่วโมง	21.5	10.9	16.0
3. กลุ่มใช้แรงปานกลาง เช่น เดินขายของ ทำงานบ้าน	36.4	56.3	46.7
4. กลุ่มทำงานนั่งหรือยืน โดยไม่มีการออกแรงหรือมีการออกแรงติดต่อกันน้อยกว่า 10 นาที เช่น งานนั่งโต๊ะ งานเอกสาร	22.7	25.1	24.0

ตามแบบประเมิน 2011 BRFSS Physical Activity Questions ของ US-CDC พบความชุก 56.7 เป็นผู้ทำงานปกติหรือดำเนินชีวิตปกติ ไม่มีกิจกรรมทางกาย สันทนาการ หรือได้ออกกำลังกายอื่นๆ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (Inactive) ส่วนที่เหลือ 43.3% มีกิจกรรมทางกายอื่นๆ นอกจากงานปกติ เมื่อพิจารณาด้วยเกณฑ์ประเมิน 2011 BRFSS Physical Activity Questions ของ US-CDC พบร้อยละ 34.9 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอตามเกณฑ์ (insufficiently active) และเพียงร้อยละ 7.4 มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตามเกณฑ์ (active) คือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงปานกลางระหว่าง 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ หรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงหนักระหว่าง 75-150 นาทีต่อสัปดาห์ขึ้นไป เพศชายพบความชุก 8.5 มากกว่าเพศหญิงพบความชุก 6.4 แนวโน้มความชุกผู้ที่มีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอื่นได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อระดับการศึกษาหรือระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้น



รูปที่ 2 ประมาณการความชุกผู้ที่มีกิจกรรมทางกายในประชากรอายุ 15-79 ปี พ.ศ. 2561

ค่าประมาณความชุกสถานะสุขภาพในประชากรอายุ 15-79 ปี ตามตารางที่ 2

การรับรู้สถานะสุขภาพโดยรวมจากการประเมินตนเอง (self-rated) ด้วยแบบประเมิน Healthy day พบความชุก 69.6 ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีเยี่ยม ดีมาก หรือดี เพศชายมีความชุก 72.7 ประเมินว่าสุขภาพตนเองดีเยี่ยม ดีมาก หรือดี สูงกว่าเพศหญิงพบความชุก 66.7 เมื่ออายุสูงขึ้นแนวโน้มการรับรู้สุขภาพโดยรวมว่าดีเยี่ยม ดีมาก หรือดี ลดลงตามลำดับ แต่เมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น พบแนวโน้มการประเมินสุขภาพตนเองว่าดีเยี่ยม ดีมาก หรือดี เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการประเมินตนเองว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D) ได้แก่ การเคลื่อนไหว การดูแลตนเอง ความเจ็บปวดหรือความไม่สบาย และความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้า ผู้มีคุณภาพชีวิตดี หมายถึง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่มีความบกพร่องทั้ง 5 ด้าน พบความชุกรวม 78.4 เพศชายประเมินตนเองว่ามีคุณภาพชีวิตดี มีความชุก 81.4 สูงกว่าเพศหญิงพบความชุก 75.6 เมื่อกลุ่มอายุสูงขึ้นพบแนวโน้มการประเมินว่าไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้านหรือ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีลดลงตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากระดับการศึกษาและรายได้ของบุคคล พบแนวโน้มการประเมินตนเองไม่มีปัญหาการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาและระดับรายได้ที่สูงขึ้น

การตระหนักทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูง จากข้อคำถาม ท่านเคยได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ พบความชุก 16.5 ที่เคยได้รับการบอกหรือทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูง หรือประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี มีจำนวน 6,893,875 คน เพศหญิงพบความชุกภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศชายพบความชุก 17.9 และ 15.0 ตามลำดับ เมื่อกลุ่มอายุสูงขึ้นพบมีภาวะความดันโลหิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ แนวโน้มการเพิ่มความชุกนี้สูงขึ้นมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี มีความชุก 15.8 เพิ่มจากความชุก 6.9 ในกลุ่มอายุ 35-44 ปี และกลุ่มอายุ 55-64 ปี พบความชุก 28.7 หรือพบ 1 คน ใน 4 คนมีภาวะความดันโลหิตสูง สำหรับกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป พบความชุก 39-44 หรือพบ 4 คน ใน 10 คนมีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังพบความชุกที่สูงในกลุ่มผู้มีระดับการศึกษาต่ำ คือกลุ่มผู้ไม่ได้รับการศึกษา พบความชุก 28.1 กลุ่มผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษาพบความชุก 24.2 ความชุกนี้จะลดลงตามลำดับเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าพบความชุกนี้น้อยที่สุดเท่ากับ 9.5

การตระหนักทราบว่าตนมีโรคเบาหวาน จากคำถาม ท่านเคยได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล ว่ามีโรคเบาหวานหรือไม่ พบความชุก 9.8 ที่เคยได้รับการบอกหรือทราบว่าตนมีโรคเบาหวาน หรือประมาณประชากรอายุ 15-79 ปี มีจำนวน 3,378,607 คน เพศหญิงมีความชุกนี้สูงกว่าเพศชาย พบความชุก 11 และ 8 ตามลำดับ และแนวโน้มความชุกสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความชุกจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุ 35 ปี และเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป พบความชุกสูงที่สุดเท่ากับ 19.7 หรือพบ 1 คน ใน 5 คนมีโรคเบาหวาน แต่พบแนวโน้มความชุกที่ทราบว่าตนมีโรคเบาหวานลดลงเมื่อระดับการศึกษาหรือระดับรายได้สูงขึ้น

การตระหนักทราบว่าตนมีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ จากคำถาม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงหรือไม่ พบความชุก 23.4 หรือประมาณประชากรอายุ 15-79 ปี มีจำนวน 5,498,774 คน เพศหญิงมีความชุกสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย มีความชุก 24.7 และ 21.7 ตามลำดับ แนวโน้มความชุกนี้สูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปพบ 1 คน ใน 3 คนมีระดับไขมันในเลือดสูง แต่แนวโน้มความชุกนี้ลดลงเมื่อระดับการศึกษาหรือระดับรายได้สูงขึ้นเช่นเดียวกับความชุกการตระหนักทราบว่าตนมีโรคเบาหวาน

ค่าประมาณความชุกการเข้ารับบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายใน 1 ปีที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี ตามตารางที่ 3

การได้ตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุก 41.2 เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชายเท่ากับ 44.3 และ 37.9 ตามลำดับ แนวโน้มความชุกนี้เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุหรือระดับรายได้เพิ่มขึ้น

การได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่ไม่ใช่การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุก 22.3 เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชายเท่ากับ 25.9 และ 18.5 ตามลำดับ กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีความชุกผู้ไปพบทันตแพทย์หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่ไม่ใช่การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา มากที่สุดเท่ากับ 24.5 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-64 ปี พบความชุก 23 แนวโน้มความชุกนี้เพิ่มขึ้นเมื่อระดับการศึกษาและระดับรายได้เพิ่มสูงขึ้น

การได้รับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลากรทางสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุก 34.7 เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชาย เท่ากับ 38.3 และ 30.9 ตามลำดับ แนวโน้มความชุกนี้สูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปพบความชุก 55.8-56.8 หรือประมาณ 5-6 คน ใน 10 คน มีการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดใน 12 เดือนที่ผ่านมา

การได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตโดยบุคลากรทางสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุก 68 เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชาย เท่ากับ 72.2 และ 64.4 ตามลำดับ แนวโน้มความชุกเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป พบความชุก 82.3-85.2 หรือประมาณ 8 คน ใน 10 คน มีการตรวจวัดความดันโลหิตใน 12 เดือนที่ผ่านมา

การได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา มีค่าประมาณความชุก 55.1 เพศหญิงมีความชุกมากกว่าเพศชาย เท่ากับ 60.4 และ 49.5 ตามลำดับ แนวโน้มความชุกสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป พบความชุก 74.0-78.3 หรือประมาณ 7 คน ใน 10 คน มีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน ใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ตารางที่ 1 ค่าประมาณความชุกปัจจัยเสี่ยงในประชากรอายุ 15-79 ปี

ความชุก (95%CI)	Overweight	Obesity	Tobacco use	Alcohol drink	Heavy drink	Binge drink	Vegetable intake	Physical activity
รวม	22.7 (22.0-23.4)	7.8 (7.2-8.4)	16.8 (14.4-19.2)	22.3 (19.5-25.2)	5.9 (4.9-6.8)	9.6 (7.1-12.1)	33.0 (26.6-39.3)	7.4 (6.0-8.8)
ชาย	20.7 (19.7-21.7)	6.1 (5.6-6.5)	32.6 (27.8-37.4)	36.2 (32.2-40.2)	11.3 (9.5-13.1)	16.0 (12.3-19.7)	30.9 (24.8-37.0)	8.5 (6.8-10.3)
หญิง	24.6 (23.5-25.8)	9.4 (8.6-10.3)	2.0 (1.9-2.2)	9.4 (7.3-11.5)	0.8 (0.6-1.0)	3.6 (2.2-5.0)	34.9 (28.3-41.5)	6.4 (5.2-7.6)
15-24 ปี	10.5 (9.2-11.7)	5.3 (4.3-6.3)	13.0 (10.5-15.6)	17.9 (14.6-21.2)	4.1 (3.1-5.1)	8.3 (5.9-10.7)	28.8 (24.0-33.7)	8.0 (6.7-9.3)
25-34 ปี	19.9 (18.6-21.2)	9.2 (8.1-10.2)	20.0 (15.4-24.7)	27.6 (24.2-31.0)	7.3 (5.8-8.7)	11.9 (8.8-14.9)	32.6 (25.3-39.8)	6.9 (5.3-8.5)
35-44 ปี	24.9 (23.7-26.0)	9.4 (8.4-10.4)	19.6 (17.6-21.5)	27.6 (23.9-31.3)	8.0 (6.5-9.6)	13.0 (9.5-16.4)	33.3 (27.0-39.7)	6.5 (5.4-7.5)
45-54 ปี	27.9 (26.5-29.4)	8.4 (7.3-9.5)	18.1 (15.4-20.9)	25.8 (22.6-29.0)	7.2 (6.0-8.3)	11.1 (8.2-13.9)	35.1 (27.4-42.7)	7.4 (5.5-9.3)
55-64 ปี	29.1 (27.6-30.7)	8.4 (7.3-9.4)	16.2 (14.1-18.3)	20.4 (17.9-22.9)	5.2 (4.3-6.1)	8.0 (5.5-10.5)	36.1 (29.2-43.0)	7.8 (5.8-9.7)
65-74 ปี	25.5 (22.5-28.6)	5.7 (4.5-7.0)	13.7 (11.7-15.6)	12.9 (10.7-15.1)	2.8 (2.1-3.4)	4.3 (3.1-5.6)	31.3 (24.8-37.9)	8.6 (6.8-10.5)
75-79 ปี	16.5 (14.5-18.6)	4.2 (2.7-5.8)	10.5 (8.3-12.6)	8.7 (5.9-11.6)	1.1 (0.5-1.7)	2.4 (1.3-3.6)	30.3 (24.7-35.8)	6.9 (3.9-9.9)
ไม่ได้รับการศึกษา	23.3 (20.3-26.4)	7.4 (5.3-9.5)	14.5 (12.2-16.7)	11.6 (8.3-14.9)	2.3 (0.7-3.9)	3.9 (1.8-5.9)	30.1 (25.3-34.8)	4.1 (1.7-6.5)
ประถมศึกษา	26.1 (25.0-27.2)	8.4 (7.6-9.1)	18.5 (16.6-20.4)	21.7 (18.8-24.6)	5.7 (4.8-6.5)	8.8 (6.3-11.4)	32.6 (25.7-39.4)	6.7 (5.1-8.2)
มัธยมศึกษา	19.7 (18.6-20.7)	7.2 (6.5-7.9)	17.2 (14.5-19.9)	23.6 (20.3-26.9)	6.6 (5.2-7.9)	11.1 (8.2-14.0)	32.3 (25.7-38.8)	7.4 (6.0-8.7)
ปวส./ปศ.สูง/ อนุปริญญา	20.0 (18.4-21.5)	7.5 (5.9-9.1)	17.1 (11.6-22.5)	26.8 (22.4-31.3)	8.5 (6.2-10.8)	10.5 (7.4-13.7)	38.0 (29.8-46.2)	9.9 (7.4-12.5)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	21.4 (20.1-22.6)	8.2 (6.9-9.6)	8.8 (6.2-11.4)	21.9 (19.3-24.4)	3.9 (3.2-4.7)	8.8 (6.5-11.1)	36.0 (29.6-42.5)	11.0 (9.5-12.6)
ไม่มีรายได้	15.3 (13.6-17.1)	8.1 (6.1-10.1)	10.7 (9.2-12.1)	12.4 (9.5-15.2)	2.5 (1.8-3.1)	4.9 (3.3-6.5)	29.8 (24.1-35.5)	5.9 (4.2-7.7)
1-4,999 บาท	21.4 (20.2-22.6)	7.0 (6.3-7.8)	15.8 (14.1-17.5)	19.1 (16.8-21.4)	4.1 (3.4-4.8)	9.1 (6.9-11.3)	31.9 (24.6-39.2)	7.8 (6.2-9.4)
5,000-9,999 บาท	23.9 (22.7-25.0)	7.7 (6.5-8.8)	19.3 (16.9-21.6)	25.9 (22.5-29.4)	7.5 (6.2-8.8)	12.1 (8.3-15.9)	34.9 (27.3-42.6)	7.4 (5.9-8.9)
10,000- 24,000 บาท	23.6 (22.7-24.5)	9.0 (8.0-10.1)	19.0 (14.8-23.3)	25.8 (21.8-29.8)	7.8 (6.0-9.6)	10.8 (7.6-14.1)	34.3 (27.0-41.6)	8.3 (6.4-10.1)
มากกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป	28.1 (26.1-30.1)	8.0 (6.8-9.2)	14.8 (10.9-18.6)	29.0 (26.8-31.3)	8.2 (7.1-9.3)	13.2 (10.3-16.1)	37.6 (31.0-44.2)	11.2 (9.9-12.5)

คำจำกัดความ

1. Overweight : ผู้มีค่าดัชนีมวลกาย 25.0-29.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร
2. Obesity : ผู้มีค่าดัชนีมวลกาย 30.0 กิโลกรัม/ตารางเมตรขึ้นไป
3. Tobacco use : ผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน
4. Alcohol drink : ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา
5. Heavy drink : ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือผู้หญิงดื่มเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานใน 30 วันที่ผ่านมา
6. Binge drink : ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน หรือผู้หญิงดื่มมากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้งใน 30 วันที่ผ่านมา
7. Vegetable intake : ผู้รับประทานผักหรือผลไม้เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 5 ถ้วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา
8. Physical activity : ผู้มีกิจกรรมทางกายอื่นหรือได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอใน 30 วันที่ผ่านมา (2011BRFSS Physical Activity Questions)

ตารางที่ 2 ค่าประมาณความชุกสถานะสุขภาพในประชากรอายุ 15-79 ปี

ความชุก (95%CI)	General health	Lipidemic awareness	BP high awareness	DM awareness	Quality of Life
รวม	69.6 (67.9-71.3)	23.4 (21.1-25.7)	16.5 (15.0-18.0)	9.8 (8.9-10.6)	78.4 (75.6-81.2)
ชาย	72.7 (71.5-74.0)	21.7 (19.0-24.5)	15.0 (13.2-16.7)	8.0 (7.0-9.0)	81.4 (78.7-84.0)
หญิง	66.7 (64.3-69.0)	24.7 (22.4-26.9)	17.9 (16.5-19.2)	11.1 (10.2-12.1)	75.6 (72.6-78.6)
15-24 ปี	92.0 (90.5-93.5)	3.8 (2.1-5.6)	0.7 (0.5-0.9)	1.3 (0.5-2.1)	92.0 (90.1-93.8)
25-34 ปี	82.2 (80.6-83.8)	8.0 (6.3-9.8)	2.5 (1.7-3.3)	2.0 (1.0-2.9)	89.0 (85.9-92.1)
35-44 ปี	73.4 (71.6-75.2)	14.0 (12.2-15.8)	6.9 (6.2-7.6)	4.2 (3.3-5.1)	84.5 (82.0-87.0)
45-54 ปี	65.1 (62.6-67.5)	24.4 (22.0-26.7)	15.8 (14.1-17.4)	8.0 (7.1-8.9)	84.5 (82.0-87.0)
55-64 ปี	54.8 (52.7-57.0)	32.6 (29.0-36.1)	28.7 (26.3-31.1)	15.9 (14.5-17.2)	67.4 (64.1-70.7)
65-74 ปี	45.9 (43.6-48.2)	35.2 (32.7-37.8)	39.0 (34.7-43.3)	19.7 (17.2-22.1)	55.4 (51.1-59.8)
75-79 ปี	37.9 (33.1-42.7)	35.0 (29.2-40.9)	44.1 (39.8-48.5)	18.9 (15.5-22.2)	45.3 (39.9-50.6)
ไม่ได้รับการศึกษา	46.4 (38.7-54.0)	31.9 (26.1-37.7)	28.1 (23.6-32.7)	13.5 (7.9-19.1)	56.9 (50.1-63.7)
ประถมศึกษา	57.9 (55.8-60.0)	29.6 (26.6-32.7)	24.2 (21.3-27.2)	13.7 (12.4-15.0)	70.0 (66.8-73.3)
มัธยมศึกษา	79.4 (78.0-80.9)	15.8 (13.7-17.8)	8.5 (7.5-9.6)	5.6 (4.6-6.7)	85.9 (83.0-88.7)
ปวส/ปทส.สูง/อนุปริญญา	83.5 (80.9-86.1)	16.2 (13.2-19.1)	8.5 (6.9-10.1)	5.2 (4.0-6.4)	85.4 (82.1-88.8)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	77.7 (75.7-79.8)	18.4 (16.4-20.4)	9.5 (8.2-10.7)	3.9 (3.2-4.7)	85.9 (82.5-89.2)
ไม่มีรายได้	71.2 (69.2-73.3)	23.6 (19.5-27.7)	16.5 (14.3-18.6)	11.5 (8.0-15.0)	77.3 (73.4-81.2)
1-4,999 บาท	61.5 (59.2-63.8)	29.5 (25.5-33.5)	21.8 (18.8-24.8)	13.7 (11.6-15.8)	71.0 (67.6-74.5)
5,000-9,999 บาท	72.7 (70.2-75.1)	20.7 (17.4-23.9)	14.2 (12.2-16.3)	8.5 (7.5-9.5)	81.1 (77.3-84.9)
10,000- 24,000 บาท	74.9 (71.7-78.1)	19.1 (16.9-21.3)	11.5 (10.4-12.6)	6.1 (5.1-7.0)	84.0 (80.9-87.1)
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป	72.5 (70.3-74.7)	24.1 (22.1-26.0)	15.1 (13.9-16.3)	6.7 (5.1-8.3)	82.3 (78.9-85.6)

คำจำกัดความ

1. General health : ผู้ประเมินสภาวะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม (self-rate)
2. Lipidemic awareness : ผู้ที่ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ
3. BP high awareness : ผู้ที่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ
4. DM awareness : ผู้ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน
5. Quality of life : ผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)

ตารางที่ 3 ค่าประมาณความชุกผู้รับบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี

ความชุก (95%CI)	Last Checkup	Last dent	Last choles	Last BP	Last blood sugar
รวม	41.2 (37.0-45.5)	22.3 (20.5-24.2)	34.7 (32.6-36.8)	68.4 (65.0-71.9)	55.1 (53.1-57.2)
ชาย	37.9 (34.0-41.9)	18.5 (16.8-20.2)	30.9 (28.9-32.9)	64.4 (61.3-67.6)	49.5 (47.1-52.0)
หญิง	44.3 (39.7-48.9)	25.9 (23.8-28.1)	38.3 (35.8-40.7)	72.2 (69.0-75.4)	60.4 (58.2-62.6)
15-24 ปี	28.8 (24.9-32.6)	24.5 (22.0-26.9)	11.0 (8.8-13.2)	42.8 (38.0-47.5)	19.2 (16.5-22.0)
25-34 ปี	33.2 (29.1-37.3)	22.6 (19.9-25.3)	22.9 (20.2-25.7)	57.1 (52.7-61.6)	39.5 (37.2-41.8)
35-44 ปี	39.5 (35.8-43.2)	20.8 (18.7-22.9)	32.7 (30.0-35.4)	69.3 (66.7-71.9)	56.8 (54.7-58.9)
45-54 ปี	44.1 (39.4-48.9)	21.3 (19.2-23.4)	39.9 (36.6-43.2)	76.2 (73.1-79.4)	66.6 (64.1-69.1)
55-64 ปี	49.8 (44.0-55.6)	23.0 (20.8-25.3)	50.4 (47.4-53.4)	82.3 (79.1-85.5)	74.0 (71.1-76.9)
65-74 ปี	54.3 (48.3-60.3)	22.8 (19.7-25.8)	55.8 (51.4-60.2)	85.9 (83.0-88.8)	79.3 (76.4-82.3)
75-79 ปี	56.8 (50.1-63.4)	18.8 (15.0-22.6)	56.8 (51.6-62.1)	85.2 (83.4-87.1)	78.3 (75.6-81.0)
ไม่ได้รับการศึกษา	41.8 (37.5-46.1)	16.5 (13.7-19.2)	39.0 (32.0-45.9)	75.8 (70.3-81.3)	66.2 (62.5-69.9)
ประถมศึกษา	46.3 (40.5-52.0)	20.0 (17.8-22.2)	41.4 (38.1-44.7)	78.5 (75.6-81.4)	68.5 (66.0-71.0)
มัธยมศึกษา	34.9 (31.1-38.6)	21.3 (19.3-23.2)	25.0 (23.2-26.9)	59.1 (55.6-62.6)	41.8 (39.7-43.8)
ปวส/ปทศ.สูง/อนุปริญญา	39.3 (34.3-44.4)	26.1 (23.4-28.8)	34.9 (31.0-38.9)	63.8 (59.7-67.8)	50.5 (47.3-53.6)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	48.1 (45.7-50.6)	36.9 (34.8-39.0)	45.3 (42.3-48.3)	66.8 (64.3-69.3)	54.1 (51.0-57.3)
ไม่มีรายได้	37.7 (32.4-43.0)	25.3 (21.4-29.3)	24.4 (21.1-27.6)	51.8 (47.3-56.4)	34.6 (30.3-38.8)
1-4,999 บาท	45.9 (40.4-51.3)	21.3 (19.4-23.2)	34.7 (32.2-37.1)	75.2 (72.8-77.7)	61.0 (59.1-62.9)
5,000-9,999 บาท	39.6 (35.2-44.1)	21.3 (19.6-22.9)	31.7 (28.7-34.7)	70.0 (66.5-73.6)	57.2 (54.1-60.3)
10,000- 24,000 บาท	40.7 (37.5-43.9)	23.2 (21.2-25.1)	37.9 (35.4-40.5)	65.6 (62.2-69.0)	52.5 (49.8-55.1)
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป	52.1 (47.3-56.9)	35.1 (30.8-39.4)	54.9 (51.9-57.9)	75.0 (73.3-76.6)	63.7 (60.5-67.0)

คำจำกัดความ

1. Last Checkup : ผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา
2. Last dent : ผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา
3. Last choles : ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา
4. Last BP : ผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา
5. Last blood sugar : ผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ประเทศไทย

ประเทศไทย มีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร ประชากรจากการประมาณการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งหมด 67,726,419 คน ชาย 33,032,992 คน และหญิง 34,693,427 คน

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 44,171 คน	เพศชาย 21,584 คน	เพศหญิง 22,587 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 54,565,360 คน	เพศชาย 23,558,898 คน	เพศหญิง 28,069,090 คน

16.8% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	22.7% มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน	7.8% มีภาวะอ้วน
22.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.6% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
23.4% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	88.5% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
16.5% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	91.8% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.7% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	92.8% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	78.0 (73.482-7)	78.0 (72.8-84.0)	78.0 (73.7-82.5)
- ประกันสังคม	13.1 (9.4-16.9)	13.2 (9.4-17.0)	13.1 (9.4-16.8)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	4.4 (3.2-5.5)	4.3 (3.0-5.7)	4.3 (3.2-5.5)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	4.8 (4.0-5.5)	4.5 (3.7-5.2)	5.0 (4.2-5.9)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.8 (0.5-1.0)	0.8 (0.6-1.1)	0.8 (0.5-1.0)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	22.7 (22.0-23.4)	20.7 (19.7-21.7)	24.6 (23.5-25.8)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	7.8 (7.2-8.4)	7.8 (7.2-8.4)	9.4 (8.6-10.3)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	38.8 (37.0-40.7)	22.8 (20.5-25.1)	54.1 (52.1-56.1)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	16.8 (14.4-19.2)	32.6 (27.8-37.4)	2.0 (1.9-2.2)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	22.3 (19.5-25.2)	36.2 (32.2-40.2)	9.4 (7.3-11.5)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.9 (4.9-6.8)	11.3 (9.5-13.1)	0.8 (0.6-1.0)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.6 (7.1-12.1)	16.0 (12.3-19.7)	3.6 (2.2-5.0)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	33.0 (26.6-39.3)	30.9 (24.8-37.0)	34.9 (28.3-41.5)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	69.6 (67.9-71.3)	72.7 (71.5-74.0)	66.7 (64.3-69.0)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	78.4 (75.6-81.2)	81.4 (78.7-84.0)	75.6 (72.6-78.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	23.4 (21.1-25.7)	21.7 (19.0-24.5)	24.7 (22.4-26.9)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	16.5 (15.0-18.0)	15.0 (13.1-16.8)	17.9 (16.5-19.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.8 (8.9-10.6)	8.0 (7.0-9.0)	11.1 (10.2-12.1)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อการบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	75.1 (72.5-77.7)	74.8 (71.9-77.6)	75.4 (72.8-78.0)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	41.2 (37.0-45.5)	37.9 (34.0-41.9)	44.3 (39.7-48.9)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.3 (20.5-24.2)	18.5 (16.8-20.2)	25.9 (23.8-28.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	34.7 (32.6-36.8)	30.9 (28.9-32.9)	38.3 (35.8-40.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	68.42 (65.3-71.6)	64.4 (61.3-67.6)	72.2 (69.0-75.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	55.1 (53.1-57.2)	49.5 (47.1-52.0)	60.4 (58.2-62.6)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.2 (20.0-24.4)	-	22.2 (20.0-24.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	19.4 (17.9-20.9)	16.3 (14.8-17.8)	22.3 (20.4-24.2)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	15.5 (13.5-16.4)	12.1 (10.8-13.4)	17.7 (15.7-19.6)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	9.0 (7.5-10.6)	16.7 (14.1-19.3)	0.5 (0.0-1.0)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	13.6 (10.9-16.2)	20.6 (16.8-24.4)	5.6 (3.8-7.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.9 (25.0-28.7)	25.2 (23.1-27.4)	28.0 (26.1-30.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	21.7 (19.8-23.7)	19.8 (17.4-22.2)	23.3 (21.6-25.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.6 (10.6-12.5)	9.6 (8.6-10.7)	13.1 (11.8-14.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	43.6 (40.4-46.8)	39.5 (36.4-42.5)	47.2 (43.6-50.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	77.6 (74.3-80.9)	74.2 (70.5-77.9)	80.6 (77.4-83.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	68.0 (64.9-71.2)	62.8 (59.0-66.5)	72.7 (69.6-75.8)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	4.5 (3.8-5.3)	4.6 (3.7-5.6)	4.5 (3.9-5.2)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.0 (26.0-32.0)	-	29.0 (26.0-32.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	55.0 (50.9-59.1)	-	55.0 (50.9-59.1)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ มีพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 3,185 คน	เพศชาย 1,234 คน	เพศหญิง 1,951 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 7,447,692 คน	เพศชาย 3,588,157 คน	เพศหญิง 3,859,535 คน

19.6% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	27.1% มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน	9.7% มีภาวะอ้วน
24.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	6.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.8% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
21.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	78.2% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
18.3% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	78.5% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.7% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	83.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	61.6 (57.3-65.8)	59.2 (54.5-64.0)	63.7 (59.0-68.4)
- ประกันสังคม	23.7 (21.2-26.3)	24.1 (21.2-27.0)	23.5 (20.4-26.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	11.1 (8.3-14.0)	11.4 (8.6-14.1)	10.8 (7.2-14.6)
-สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	3.9 (3.0-4.7)	4.0 (2.7-5.4)	3.7 (2.3-5.0)
-สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.6 (1.0-2.1)	1.8 (0.9-2.7)	1.4 (0.8-2.0)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	27.1 (25.2-29.1)	25.9 (23.1-28.8)	28.3 (25.9-30.6)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	9.7 (7.2-12.2)	8.5 (5.5-11.6)	10.8 (8.3-13.3)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	44.9 (42.1-47.7)	29.9 (25.3-34.5)	59.1 (55.2-63.0)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	19.6 (16.9-22.2)	36.0 (29.7-42.3)	4.3 (3.0-5.6)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	24.3 (21.3-27.4)	36.1 (29.9-42.4)	13.3 (11.5-15.1)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	6.8 (5.3-8.2)	12.8 (9.7-15.9)	1.2 (0.7-1.7)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.8 (8.5-11.2)	16.2 (13.5-18.8)	3.9 (3.2-4.7)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	16.5 (13.5-19.5)	14.4 (11.5-17.3)	18.4 (14.5-22.3)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	59.9 (57.9-62.0)	65.0 (61.4-68.5)	55.3 (52.2-58.4)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	76.2 (72.4-80.0)	80.1 (75.3-84.9)	72.5 (69.3-75.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	21.7 (18.8-24.6)	22.0 (19.8-24.3)	21.4 (17.6-25.3)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	18.3 (15.7-20.8)	19.2 (15.6-22.7)	17.5 (15.0-20.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.7 (7.8-11.7)	9.1 (7.3-10.8)	10.2 (7.8-12.7)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	76.5 (74.0-79.1)	77.1 (73.0-81.2)	76.0 (71.7-80.3)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	44.8 (42.6-47.1)	42.0 (38.5-45.5)	47.5 (43.5-51.5)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	28.0 (24.6-31.4)	24.1 (16.5-31.7)	31.6 (28.3-34.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	43.2 (40.2-46.2)	38.2 (33.9-42.6)	47.9 (44.8-50.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	58.5 (56.4-60.6)	55.1 (52.0-58.2)	61.7 (58.6-64.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	46.8 (43.5-50.2)	40.3 (34.5-46.1)	52.9 (49.9-55.8)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.3 (22.6-26.1)	-	24.3 (22.6-26.1)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	14.3 (13.4-15.2)	13.5 (11.2-16.0)	14.9 (12.8-16.9)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	10.0 (8.7-11.4)	9.8 (7.6-12.0)	10.2 (8.8-11.7)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	19.6 (16.7-22.2)	36.0 (29.6-42.3)	4.3 (3.0-5.6)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	24.3 (21.3-27.4)	36.2 (29.9-42.4)	13.3 (11.5-15.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	25.8 (23.0-28.7)	26.0 (23.8-28.1)	25.7 (21.1-30.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	24.4 (21.7-27.1)	26.1 (22.0-30.1)	23.2 (20.3-26.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.0 (10.0-13.9)	11.6 (9.7-13.4)	12.3 (9.5-15.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	52.2 (48.9-55.5)	47.2 (43.0-51.3)	56.6 (52.2-61.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	66.0 (63.5-68.5)	62.1 (58.6-65.5)	69.4 (65.8-73.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	56.8 (53.7-59.8)	50.4 (44.8-55.9)	62.4 (57.9-66.8)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	3.5 (2.1-4.9)	2.9 (1.3-4.7)	4.0 (2.4-5.6)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.7 (24.6-28.8)	-	26.7 (24.6-28.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	38.1 (35.0-41.3)	-	38.1 (35.0-41.3)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ มีพื้นที่ 11,678.37 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,034 คน

เพศชาย 1,018 คน

เพศหญิง 1,016 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 924,937 คน

เพศชาย 451,770 คน

เพศหญิง 473,167 คน

21.6% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	5.1% ภาวะอ้วน	14.5% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน
38.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	11.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	26.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
22.4% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	95.3% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
15.5% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	94.6% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
6.7% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	95.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	85.4 (81.7-89.1)	85.1 (80.3-89.9)	85.8 (82.5-89.0)
- ประกันสังคม	7.4 (5.2-9.6)	7.5 (4.5-10.6)	7.2 (5.1-9.3)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	3.8 (2.0-5.5)	3.2 (1.6-4.8)	4.4 (2.1-6.6)
-สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	3.8 (2.1-5.5)	3.4 (1.6-5.3)	4.1 (2.3-6.0)
-สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.7 (0.2-1.2)	0.9 (0.2-1.7)	0.4 (0.0-0.9)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.6 (18.9 - 24.4)	22.0 (18.0 - 26.0)	21.3 (17.8 - 24.8)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	5.1 (3.5-6.7)	5.4 (3.7-7.2)	4.8 (2.7-6.9)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	34.2 (30.3-38.2)	17.3 (13.9-20.7)	50.5 (45.0-56.1)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	14.5 (11.7-17.2)	26.4 (21.1-31.7)	3.2 (1.9-4.4)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	38.1 (32.3-43.9)	54.7 (46.9-62.5)	22.4 (16.3-28.4)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	11.1 (7.9-14.2)	21.3 (15.2-27.5)	1.3 (0.3-2.3)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	26.3 (21.6-31.1)	38.2 (30.4-46.1)	15.0 (10.2-20.0)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	46.3 (34.3-58.2)	45.9 (34.2-57.6)	46.6 (34.1-59.1)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	74.4 (69.4-79.5)	77.0 (71.8-82.2)	72.0 (65.5-78.5)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	83.0 (79.8-86.3)	83.9 (80.3-87.7)	82.2 (78.1-86.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	22.4 (17.6-27.2)	18.6 (13.5-23.6)	25.4 (18.2-32.7)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	15.5 (12.5-18.4)	13.8 (10.8-16.9)	16.9 (12.7-21.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	6.7 (5.1-8.2)	6.6 (4.3-8.9)	6.7 (4.7-8.7)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	85.9 (79.8-92.0)	87.3 (80.0-94.7)	84.7 (79.1-90.3)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	37.8 (31.1-44.5)	35.2 (28.7-41.7)	40.3 (32.4-48.1)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	20.9 (16.7-25.1)	15.9 (11.5-20.3)	25.7 (20.6-30.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.3 (22.6-32.0)	25.5 (20.1-30.8)	29.0 (23.9-34.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	78.3 (71.9-84.8)	74.9 (68.5-81.3)	81.6 (74.5-88.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	61.9 (55.8-68.0)	57.3 (51.6-63.1)	66.3 (58.7-73.8)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.0 (20.3-33.7)	-	27.0 (20.3-33.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	19.0 (12.9-25.0)	16.5 (11.0-22.0)	21.4 (14.1-28.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	14.4 (9.5-19.3)	13.0 (8.4-17.6)	15.7 (9.9-21.5)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	5.1 (0.8-9.4)	8.8 (1.0-16.6)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	21.1 (10.1-32.1)	31.6 (11.6-51.7)	6.4 (0.9-11.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	24.2 (19.4-29.0)	20.7 (15.1-26.2)	27.0 (19.6-34.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	20.6 (17.2-24.1)	18.8 (15.0-22.6)	22.2 (16.9-27.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	7.9 (6.3-9.6)	7.8 (5.2-10.4)	8.1 (5.9-10.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	35.9 (30.3-41.5)	34.4 (27.6-41.2)	37.2 (31.0-43.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	85.8 (79.2-92.3)	82.9 (75.5-90.3)	88.4 (82.3-94.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	76.0 (69.2-82.7)	72.7 (65.9-79.5)	78.9 (71.8-86.1)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	6.3 (2.6-10.0)	6.5 (2.5-10.6)	6.1 (2.2-10.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	35.1 (26.6-43.5)	-	35.1 (26.6-43.5)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	61.9 (55.1-68.9)	-	61.9 (55.1-68.9)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีพื้นที่ 20,107.06 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,009 คน

เพศชาย 1,010 คน

เพศหญิง 999 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 1,394,789 คน

เพศชาย 671,186 คน

เพศหญิง 723,603 คน

14.5% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.1% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	7.6% ภาวะอ้วน
33.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
35.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	91.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
23.4% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	95.8% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทายาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
11.3% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	97.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	74.4 (70.3-78.6)	76.2 (71.8-80.5)	72.8 (68.1-77.5)
- ประกันสังคม	15.1 (11.9-18.2)	13.6 (10.5-16.8)	16.5 (12.6-20.3)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	4.2 (3.0-5.5)	3.9 (1.7-6.1)	4.5 (2.7-6.4)
-สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	7.5 (5.1-10.1)	7.1 (4.7-9.5)	8.1 (5.0-11.1)
-สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.9 (0.5-1.3)	1.2 (0.4-1.9)	0.6 (0.0-1.2)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.1 (18.7-23.4)	22.4 (19.6-25.2)	19.8 (16.5-23.1)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	7.6 (5.6-9.5)	5.3 (3.7-6.9)	9.6 (6.4-12.7)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	39.2 (36.1-42.3)	23.1 (19.7-26.5)	54.1 (48.2-59.0)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	14.5 (12.6-16.4)	27.2 (23.8-30.7)	3.1 (1.7-4.4)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	33.1 (29.5-36.7)	51.2 (46.0-56.4)	16.7 (12.5-20.9)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.3 (6.9-11.6)	18.0 (13.9-22.2)	1.3 (0.4-2.2)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.3 (3.6-6.8)	8.8 (6.3-11.2)	2.0 (0.6-3.5)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	38.1 (28.8-47.5)	35.9 (26.2-45.6)	40.2 (30.4-49.9)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	70.4 (64.9-75.9)	74.2 (68.5-79.9)	66.9 (61.1-72.8)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	78.7 (74.6-82.9)	80.5 (76.5-84.6)	77.0 (72.0-82.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	35.7 (30.8-40.6)	34.5 (28.5-40.5)	36.7 (30.8-42.6)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	23.4 (21.4-25.4)	22.9 (20.1-25.7)	23.9 (21.5-26.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.3 (9.5-13.0)	11.2 (8.2-14.2)	11.3 (9.2-13.4)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	74.7 (69.2-80.2)	77.5 (72.0-83.1)	72.3 (65.8-78.9)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	47.2 (42.3-52.0)	45.4 (40.1-50.7)	48.8 (43.1-54.6)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	23.1 (19.2-27.0)	18.9 (15.4-22.4)	26.9 (21.2-32.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	37.2 (33.8-40.6)	35.8 (31.4-40.3)	38.5 (34.3-42.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	79.4 (74.5-84.3)	76.6 (71.2-82.1)	82.0 (76.6-87.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	62.6 (57.8-67.4)	58.7 (53.1-64.3)	66.2 (60.6-71.7)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	23.8 (19.9-27.8)	-	23.8 (19.9-27.8)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	20.5 (17.0-24.1)	19.3 (14.9-23.7)	21.7 (18.2-25.3)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	16.6 (13.2-20.0)	15.6 (11.6-19.5)	17.5 (14.2-20.8)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	11.3 (3.0-19.5)	21.6 (8.7-34.5)	0.6 (0.0-1.8)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	21.6 (11.9-31.3)	36.5 (22.9-50.0)	4.7 (0.0-10.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	37.6 (32.6-42.6)	36.1 (30.2-42.0)	38.8 (32.7-45.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	28.3 (26.1-30.6)	27.5 (24.2-30.8)	29.1 (26.4-31.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.6 (10.6-14.5)	12.3 (9.0-15.5)	12.8 (10.4-15.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.6 (41.2-50.0)	44.8 (38.9-50.6)	46.4 (40.6-52.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	86.5 (82.1-90.9)	83.9 (79.0-88.9)	88.8 (84.1-93.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	74.9 (69.6-80.3)	72.4 (67.0-77.8)	77.3 (70.5-84.0)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	5.1 (3.4-6.8)	4.3 (2.4-6.2)	5.8 (3.3-8.3)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	28.1 (22.4-33.8)	-	28.1 (22.4-33.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	59.6 (52.4-66.9)	-	59.6 (52.4-66.9)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดอุดรดิตถ์

จังหวัดอุดรดิตถ์ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 25 ของประเทศ มีพื้นที่ 7,838.59 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,010 คน

เพศชาย 1,014 คน

เพศหญิง 996 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 346,996 คน

เพศชาย 166,248 คน

เพศหญิง 180,748 คน

16.2% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.8% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	7.1% ภาวะอ้วน
23.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.4% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	12.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
24.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	98.5% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
21.2% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	97.6% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
11.1% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	95.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	85.6 (82.6-88.5)	88.0 (84.7-91.3)	83.4 (78.9-87.9)
- ประกันสังคม	6.8 (4.5-9.0)	5.6 (3.9-7.4)	7.8 (3.5-12.2)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	1.2 (0.3-2.1)	1.4 (0.2-2.8)	1.0 (0.2-1.8)
-สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	4.6 (3.1-6.2)	4.2 (2.1-6.1)	5.1 (3.0-7.2)
-สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.4 (0.0-0.7)	0.2 (0.0-0.5)	0.6 (0.0-1.2)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.8 (19.6-24.1)	18.2 (15.3-21.2)	25.1 (21.8-28.5)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	7.1 (5.4-8.7)	5.3 (3.5-7.1)	8.7 (6.3-11.0)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	39.9 (36.2-43.6)	22.2 (17.0-27.5)	56.3 (51.7-60.8)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	16.2 (13.2-19.3)	29.5 (23.8-35.2)	4.1 (2.1-6.1)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	23.6 (20.4-26.9)	40.6 (34.7-46.4)	8.1 (5.5-10.6)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.4 (5.3-9.5)	14.0 (9.8-18.2)	1.3 (0.3-2.4)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	12.8 (9.6-16.0)	21.7 (16.3-27.1)	4.6 (2.9-6.4)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	37.1 (29.3-44.9)	31.4 (23.5-39.4)	42.3 (33.4-51.3)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	71.8 (65.1-78.6)	76.0 (67.6-84.3)	68.0 (60-75.3)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	70.6 (63.8-77.3)	75.1 (68.2-82.0)	66.5 (59.3-73.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	24.7 (17.8-31.6)	20.5 (13.2-27.9)	27.4 (20.1-34.7)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	21.2 (18.3-24.1)	19.4 (15.8-23.0)	22.6 (19.4-25.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.1 (9.2-13.1)	10.3 (7.4-13.2)	11.7 (9.5-13.9)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	82.0 (74.4-89.6)	82.2 (74.0-90.4)	81.9 (74.5-89.3)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	43.7 (37.2-50.2)	36.6 (29.1-44.2)	50.2 (42.8-57.5)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.9 (20.2-33.6)	20.2 (13.1-27.2)	33.1 (25.6-40.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	39.6 (34.6-44.6)	31.0 (26.5-35.4)	47.5 (40.2-54.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	74.5 (69.0-80.1)	70.0 (62.1-77.9)	78.7 (73.8-83.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	58.8 (53.2-64.4)	51.2 (44.6-57.7)	65.7 (59.0-72.3)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.8 (20.8-32.8)	-	26.8 (20.8-32.8)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	14.6 (11.9-17.4)	10.6 (7.7-13.4)	18.4 (13.4-23.5)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	12.7 (9.8-15.5)	8.9 (5.9-11.8)	16.3 (11.3-21.3)

ค่าประมาณความชุกการสำรวจฯ ของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	8.7 (3.9-13.5)	15.7 (4.4-25.0)	0.7 (0.0-2.1)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	12.3 (6.6-18.0)	16.2 (5.6-26.8)	7.1 (0.0-15.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.2 (19.1-33.3)	21.1 (13.2-29.0)	29.6 (22.2-36.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	26.1 (22.9-29.4)	24.4 (19.9-28.9)	27.5 (23.8-31.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.1 (10.0-14.2)	10.6 (7.4-13.8)	13.1 (10.6-15.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	48.8 (42.9-54.6)	39.0 (32.9-45.2)	57.4 (50.4-64.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.9 (76.4-87.4)	76.0 (67.6-84.5)	87.1 (82.5-91.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.1 (65.6-78.5)	65.0 (57.0-72.9)	78.2 (71.3-85.1)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	3.0 (1.7-4.3)	2.6 (1.1-4.2)	3.2 (1.6-5.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	36.4 (27.2-45.7)	-	36.4 (27.2-45.7)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	61.0 (52.5-69.5)	-	61.0 (52.5-69.5)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ มีพื้นที่ 9,597.68 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,087 คน	เพศชาย 1,039 คน	เพศหญิง 1,048 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 781,831 คน	เพศชาย 374,291 คน	เพศหญิง 407,540 คน

13.4% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	24.1% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	9.5% ภาวะอ้วน
14.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.4% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	2.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
23.8% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	96.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
19.1% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	96.7% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับทราบมาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.3% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	94.2% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	85.6 (79.1-92.0)	83.8 (75.5-92.1)	87.2 (81.5-92.8)
- ประกันสังคม	6.5 (3.3-9.8)	8.7 (3.7-13.8)	4.5 (2.1-7.0)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	3.2 (1.5-5.0)	3.2 (0.0-6.5)	3.4 (1.7-5.0)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	2.6 (1.5-3.8)	2.3 (1.0-3.6)	2.9 (1.4-4.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.4 (0.2-0.7)	0.4 (0.0-0.8)	0.4 (0.0-0.9)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	24.1 (20.6-27.6)	22.6 (18.9-26.4)	25.5 (20.2-30.8)
ความชุกผู้ที่มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	9.5 (7.3-11.7)	6.8 (4.6-9.0)	12.0 (8.3-15.7)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	43.9 (38.3-49.4)	26.4 (20.3-32.6)	61.4 (53.6-69.1)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	13.4 (9.1-17.7)	26.4 (18.6-34.2)	1.6 (0.3-2.9)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	14.3 (10.9-17.6)	26.7 (21.0-32.4)	2.9 (1.3-4.6)
ความชุกผู้ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.4 (1.9-5.0)	7.1 (4.0-10.3)	0.05 (0.0-0.1)
ความชุกผู้ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	2.1 (1.1-3.2)	3.9 (1.9-6.0)	0.4 (0.0-0.9)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	17.1 (11.4-22.9)	16.6 (9.7-23.5)	17.7 (12.3-23.0)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	72.5 (66.6-78.4)	71.7 (64.1-79.2)	73.2 (66.9-79.6)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	83.6 (79.6-87.5)	85.5 (81.2-89.7)	81.8 (77.6-86.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	23.8 (16.3-31.2)	17.4 (10.1-24.8)	28.2 (19.2-37.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	19.1 (14.8-23.3)	15.0 (11.2-18.8)	22.6 (16.5-28.7)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.3 (6.4-12.2)	6.5 (2.9-10.0)	11.9 (8.8-15.0)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	78.0 (70.4-85.5)	72.8 (63.9-81.8)	82.3 (74.5-90.0)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	16.8 (10.4-23.3)	15.3 (8.7-21.9)	18.2 (11.1-25.4)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	9.5 (5.0-14.0)	7.1 (2.5-11.7)	11.7 (6.8-16.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.6 (20.5-34.6)	25.0 (17.0-33.0)	30.0 (22.1-37.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	61.6 (52.4-70.8)	58.0 (47.3-68.8)	64.8 (54.7-75.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	53.9 (45.9-61.9)	51.6 (41.0-62.1)	56.0 (47.5-64.6)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	14.5 (7.3-21.6)	-	14.5 (7.3-21.6)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	15.4 (10.7-20.1)	9.7 (6.1-13.2)	20.9 (14.4-27.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	12.7 (8.6-16.8)	7.7 (5.3-10.1)	17.5 (11.3-23.8)
ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง			
	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	1.9 (0.1-3.8)	4.4 (0.4-8.3)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.1 (0.1-8.1)	6.8 (0.0-14.4)	1.8 (0.0-5.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.2 (18.8-33.7)	21.0 (13.2-28.8)	29.3 (19.9-38.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	23.8 (18.5-29.1)	18.9 (14.2-23.6)	27.9 (20.3-35.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.9 (7.6-14.2)	7.9 (3.7-12.2)	13.4 (9.6-17.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	35.3 (26.7-43.9)	29.4 (20.5-38.4)	40.5 (30.5-50.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	70.5 (60.7-80.5)	67.6 (54.7-80.6)	73.2 (63.1-83.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	64.9 (55.8-74.0)	61.9 (50.3-73.7)	67.5 (58.3-76.8)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	2.2 (0.5-3.8)	2.0 (0.3-3.8)	2.3 (0.5-4.2)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	19.2 (10.0-28.4)	-	19.2 (10.0-28.4)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	41.9 (30.5-53.3)	-	41.9 (30.5-53.3)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 70 ของประเทศ มีพื้นที่ 1,525.86 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,114 คน

เพศชาย 1,068 คน

เพศหญิง 1,046 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 1,284,404 คน

เพศชาย 606, 809 คน

เพศหญิง 677,594 คน

8.4% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	23.7% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	8.0% ภาวะอ้วน
12.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
22.3% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	90.6% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
20.7% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	95.0% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทายาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
12.0% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	95.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	60.1 (54.3-65.8)	58.4 (51.0-65.9)	61.6 (54.4-68.8)
- ประกันสังคม	28.8 (24.4-33.1)	29.3 (22.1-36.5)	28.3 (23.3-33.2)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	4.3 (2.3-6.3)	3.6 (1.6-5.5)	4.9 (2.2-7.5)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	8.1 (4.3-11.9)	8.2 (4.4-11.9)	8.0 (3.8-12.1)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.6 (0.30-3.0)	1.7 (0.6-2.8)	1.6 (0.0-3.3)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	23.7 (19.2-28.1)	23.4 (18.1-28.8)	23.9 (19.8-28.0)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	8.0 (6.2-9.9)	6.7 (4.8-8.7)	9.2 (6.8-11.6)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	39.5 (32.7-46.3)	27.3 (19.9-34.7)	50.8 (43.2-58.5)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	8.4 (6.3-10.4)	15.8 (11.2-20.4)	1.8 (0.8-2.8)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	12.9 (9.9-15.8)	21.0 (16.0-26.0)	5.6 (3.7-7.6)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5 (2.2-4.8)	7.2 (4.6-9.9)	0.1 (0.0-0.3)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.1 (2.6-5.7)	7.2 (4.9-9.4)	1.4 (0.0-2.8)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	43.5 (36.0-51.1)	41.4 (31.7-51.1)	45.5 (37.3-53.6)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	74.7 (68.9-80.4)	75.9 (70.6-81.2)	73.6 (66.7-80.4)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	83.3 (79.9-86.7)	86.8 (83.9-89.7)	80.1 (75.6-84.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	22.3 (18.9-25.8)	23.4 (17.2-29.6)	21.6 (17.2-26.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	20.7 (17.1-24.3)	20.7 (16.2-25.2)	20.7 (16.8-24.5)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.0 (9.9-14.0)	10.3 (7.1-13.6)	13.1 10.9-15.2
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	71.8 (64.6-79.0)	69.4 (60.0-78.9)	73.7 (66.1-81.3)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	37.3 (31.2-43.4)	32.6 (25.8-39.4)	41.5 (35.4-47.7)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	25.9 (20.9-30.9)	23.0 (18.4-27.7)	28.5 (21.7-35.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	39.5 (32.0-46.9)	35.1 (26.2-43.9)	43.4 (36.2-50.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	58.7 (48.2-69.1)	54.2 (41.3-67.7)	62.6 (53.5-71.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	46.8 (38.5-55.0)	39.9 (30.2-49.7)	52.9 (45.2-60.5)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.6 (14.0-23.3)	-	18.6 (14.0-23.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	21.6 (14.8-28.3)	17.5 (12.4-22.6)	25.2 (16.0-34.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	18.3 (13.4-23.1)	13.6 (9.8-17.4)	22.5 (15.8-29.0)
ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง			
	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	3.5 (0.0-8.0)	7.1 (0.0-15.3)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.1 (0.2-8.4)	4.5 (0.0-9.5)	3.9 (0.0-9.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.7 (22.3-31.1)	28.2 (21.4-35.0)	25.7 (20.6-30.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	28.8 (24.5-33.1)	29.2 (23.4-30.5)	28.6 (23.9-33.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	15.4 (13.2-17.6)	12.8 (9.1-16.4)	17.3 (15.0-19.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	52.9 (46.1-59.7)	50.0 (40.9-59.2)	55.3 (47.6-63.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.1 (64.7-79.5)	68.6 (57.6-79.5)	75.0 (68.3-81.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	61.5 (54.4-68.6)	56.5 (46.9-66.2)	65.6 (58.2-73.0)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	3.6 (1.8-5.4)	3.2 (1.2-5.2)	3.9 (1.7-6.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.1 (20.9-33.3)	-	27.1 (20.9-33.3)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	50.4 (42.6-58.2)	-	50.4 (42.6-58.2)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ มีพื้นที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 1,985 คน	เพศชาย 966 คน	เพศหญิง 1,019 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 641,435 คน	เพศชาย 315,058 คน	เพศหญิง 326,377 คน

17.1% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	20.1% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	8.5% ภาวะอ้วน
19.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	8.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
21.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	91.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
18.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	94.1% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทายาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.0% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	97.3% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	68.7 (63.6-73.9)	70.5 (64.2-76.8)	67.0 (61.6-72.4)
- ประกันสังคม	25.4 (20.4-30.3)	24.0 (17.8-30.2)	26.7 (22.1-31.3)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	3.5 (2.3-4.8)	3.3 (1.8-4.8)	3.7 (2.1-5.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	3.1 (1.7-4.4)	2.4 (0.9-3.8)	3.7 (1.9-5.6)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.9 (0.2-1.7)	0.7 (0.2-1.2)	1.1 (0.1-2.1)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	20.1 (17.0-23.2)	18.9 (16.0-22.0)	21.2 (17.1-25.4)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	8.5 (6.6-10.4)	5.6 (3.5-7.6)	11.3 (8.5-14.1)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	35.9 (31.6-40.3)	17.1 (12.1-22.2)	53.8 (48.0-59.5)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	17.1 (13.0-21.2)	33.6 (25.3-41.8)	1.7 (0.8-2.5)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	19.3 (15.1-23.6)	35.1 (27.2-43.1)	4.3 (1.9-6.7)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	9.6 (6.5-12.8)	18.7 (12.4-25.1)	1 (0.1-1.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	8.8 (5.2-12.5)	16.6 (9.0-24.1)	1.4 (0.2-2.6)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยงานมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	26.4 (19.5-33.3)	25.4 (17.8-33.0)	27.3 (20.0-34.6)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	72.8 (67.1-78.5)	75.1 (68.7-81.6)	70.6 (65.0-81.6)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	82.3 (79.5-85.0)	85.1 (82.3-87.8)	79.5 (75.1-84.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	21.7 (16.1-27.3)	19.7 (12.6-26.9)	23.3 (17.4-29.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	18.0 (15.0-21.1)	15.0 (11.2-18.7)	20.7 (17.0-24.4)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.0 (8.3-11.8)	7.9 (5.3-10.6)	11.7 (9.6-13.9)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.5 (76.1-86.9)	82.5 (76.2-88.7)	80.7 (74.9-86.5)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	43.9 (36.6-51.2)	40.8 (32.4-49.2)	46.9 (39.4-54.4)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.9 (19.2-26.7)	16.4 (12.0-20.9)	29.8 (23.6-34.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	36.2 (28.9-43.4)	32.2 (24.8-39.6)	40.0 (31.7-48.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	67.9 (61.5-74.4)	62.1 (54.5-69.7)	73.5 (67.1-80.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	55.2 (47.7-67.7)	49.5 (40.3-58.6)	60.7 (53.2-68.3)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.5 (13.9-31.1)		22.5 (13.9-31.1)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	19.2 (14.3-24.2)	18.3 (12.4-24.1)	20.1 (14.9-25.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	14.3 (10.4-18.2)	14.1 (9.2-18.9)	14.5 (10.0-19.0)
ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง			
	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	8.2 (2.9-13.5)	15.7 (5.9-25.4)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	10.2 (1.1-19.2)	19.1 (2.3-35.7)	0.3 (0.0-0.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.3 (20.2-32.4)	23.5 (16.1-30.8)	28.6 (21.9-35.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	24.1 (20.1-28.2)	19.2 (14.9-23.5)	28.4 (23.2-33.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.9 (10.5-15.4)	10.5 (7.0-13.9)	14.9 (12.0-18.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.3 (37.2-53.5)	40.1 (30.7-49.5)	50.1 (40.6-59.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	76.1 (69.0-83.1)	70.7 (62.9-78.6)	81.0 (73.6-88.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	65.1 (56.1-74.1)	59.7 (49.0-70.4)	70.0 (61.2-78.8)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	1.8 (0.7-2.8)	1.2 (0.2-2.1)	2.3 (0.6-4.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.5 (21.2-37.8)	-	29.5 (21.2-37.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	51.2 (42.5-60.0)	-	51.2 (42.5-60.0)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ มีพื้นที่ 7,195.4 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,129 คน	เพศชาย 1,045 คน	เพศหญิง 1,084 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 472,168 คน	เพศชาย 231,795 คน	เพศหญิง 240,373 คน

18.2% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	22.3% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	6.3% ภาวะอ้วน
24.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	6.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	11.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
17.5% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	89.9% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
13.1% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	95.6% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.2% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	93.9% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	85.0 (79.8-90.3)	85.4 (80.1-90.7)	84.6 (78.8-90.7)
- ประกันสังคม	8.7 (3.7-13.7)	8.5 (2.8-14.2)	8.9 (4.2-13.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.9 (0.9-5.0)	2.5 (0.5-4.5)	3.4 (0.8-5.9)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	3.5 (2.2-4.9)	3.1 (1.2-5.0)	3.9 (2.1-5.7)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.5 (0.06-.09)	0.5 (0.0-1.1)	0.5 (0.0-1.0)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	22.3 (17.9-26.6)	20.2 (14.9-25.5)	24.3 (19.5-29.1)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	6.3 (4.5-8.2)	4.4 (2.4-6.3)	8.2 (5.7-10.9)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	42.3 (36.8-47.7)	22.3 (15.6-29.0)	62.0 (54.8-69.2)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	18.2 (14.5-22.0)	35.9 (28.5-43.4)	1.2 (0.5-1.9)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	24.2 (19.6-28.9)	37.3 (29.9-44.6)	12.1 (7.5-16.6)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	6.2 (4.2-8.2)	12.5 (8.3-16.6)	0.4 (0.0-0.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	11.8 (8.8-14.7)	19.3 (14.5-24.0)	4.5 (2.2-6.7)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	32.7 (24.3-41.1)	35.4 (25.6-45.1)	30.2 (21.3-39.1)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	69.0 (62.8-75.2)	70.9 (64.4-77.4)	67.3 (60.5-74.1)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	77.5 (71.4-83.7)	82.2 (76.8-87.6)	73.1 (65.5-80.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	17.5 (12.3-22.8)	16.2 (10.2-22.3)	18.6 (12.4-24.8)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	13.1 (9.8-16.3)	11.7 (8.1-15.3)	14.2 (9.7-18.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.2 (6.1-12.3)	6.5 (3.5-9.6)	11.3 (6.2-16.3)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	65.3 (55.7-74.9)	63.6 (52.4-74.8)	66.6 (56.6-76.6)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	36.7 (29.5-43.9)	34.0 (26.8-41.3)	39.2 (30.6-47.9)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.9 (15.1-22.7)	16.3 (12.4-20.2)	21.4 (16.7-26.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.7 (24.5-34.9)	25.4 (19.6-31.1)	34.0 (28.7-39.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	57.8 (51.3-64.3)	53.2 (45.2-61.2)	62.3 (55.3-69.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.3 (39.6-51.0)	40.3 (33.9-46.6)	50.3 (43.8-56.9)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	12.4 (7.7-17.1)	-	12.4 (7.7-17.1)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	19.1 (14.9-23.2)	14.2 (10.2-18.3)	23.7 (17.7-29.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	14.7 (10.6-18.7)	10.1 (6.7-13.5)	18.9 (12.5-25.4)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	9.8 (4.2-15.4)	18.2 (7.9-28.5)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	14.3 (7.2-21.4)	21.4 (8.7-34.1)	6.4 (0.0-14.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	20.2 (13.9-26.5)	19.2 (11.4-26.9)	21.1 (14.2-28.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	16.6 (12.1-21.2)	14.7 (10.1-19.3)	18.3 (12.1-24.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.5 (6.7-14.4)	7.3 (3.8-10.8)	12.9 (7.0-18.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	39.1 (31.8-46.3)	34.6 (26.0-43.2)	43.3 (36.2-50.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	69.6 (62.8-76.5)	66.2 (57.5-74.9)	72.8 (65.9-79.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.0 (51.3-66.7)	53.6 (44.1-63.2)	64.0 (56.1-71.9)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	1.9 (0.7-3.2)	2.3 (0.5-4.0)	1.6 (0.4-2.9)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	17.0 (10.3-23.7)	-	17.0 (10.3-23.7)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	43.8 (36.2-51.3)	-	43.8 (36.2-51.3)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 56 ของประเทศ มีพื้นที่ 3,576.49 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,070 คน	เพศชาย 1,025 คน	เพศหญิง 1,045 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 578,793 คน	เพศชาย 286,656 คน	เพศหญิง 292,137 คน

8.3% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	26.0% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	10.1% ภาวะอ้วน
12.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.7% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
16.3% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	86.5% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
17.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	90.7% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
7.2% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	93.9% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	67.7 (62.9-72.4)	66.0 (61.1-70.8)	69.3 (63.0-75.5)
- ประกันสังคม	22.3 (17.8-26.8)	21.8 (16.8-26.9)	22.7 (16.9-28.5)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.5 (1.3-3.6)	2.9 (0.8-5.0)	2.1 (0.8-3.2)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	2.5 (1.5-3.4)	2.1 (0.9-3.2)	2.8 (1.4-4.2)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.0 (0.1-2.0)	1.0 (0.2-1.8)	1.1 (0.0-2.1)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	26.0 (23.3-28.8)	26.1 (3.0-29.2)	26.0 (21.4-30.5)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	10.1 (8.0-12.1)	8.0 (4.2-11.7)	12.1 (9.9-14.3)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	37.8 (32.3-43.2)	26.0 (20.4-31.7)	49.1 (39.7-58.5)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	8.3 (6.4-10.3)	16.1 (12.5-19.8)	1.1 (0.3-1.9)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	12.2 (9.0-15.3)	19.0 (14.6-23.3)	5.7 (3.2-8.2)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.7 (2.2-5.2)	6.3 (4.0-8.6)	1.2 (0.3-2.2)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5 (2.0-4.9)	5.3 (3.4-7.3)	1.6 (0.4-2.8)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	22.0 (14.6-29.4)	22.3 (14.4-30.2)	21.7 (13.6-29.9)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	77.3 (71.4-83.1)	78.7 (72.3-85.2)	75.8 (69.4-82.1)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	81.6 (77.9-85.3)	83.1 (78.9-87.2)	80.1 (75.2-85.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	16.3 (10.8-21.8)	11.5 (4.9-18.1)	20.4 (14.5-26.3)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	17.0 (12.4-21.7)	15.2 (9.2-21.3)	18.7 (13.8-23.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	7.2 (5.3-9.0)	5.8 (3.8-7.9)	8.5 (5.7-11.2)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	75.1 (68.3-81.8)	74.2 (64.8-83.6)	75.9 (69.3-82.5)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.4 (23.4-35.4)	28.9 (21.8-35.9)	29.9 (21.1-38.7)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.1 (14.2-21.9)	16.8 (10.9-22.7)	19.4 (13.7-25.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	33.2 (26.7-39.8)	32.5 (24.0-41.1)	33.9 (27.3-40.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	53.7 (46.2-61.3)	52.1 (43.0-61.1)	55.3 (45.9-64.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	47.8 (40.4-55.3)	46.4 (37.6-55.3)	49.2 (41.0-57.3)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	11.3 (7.2-15.4)	-	11.3 (7.2-15.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	17.5 (13.6-21.3)	16.8 (11.4-22.2)	18.1 (13.9-22.3)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	13.3 (10.2-16.3)	11.5 (7.6-15.4)	15.0 (11.0-18.9)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	6.5 (0.0-15.3)	14.0 (0.0-32.2)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.6 (0.0-10.3)	10.0 (0.0-21.5)	-
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	19.2 (12.6-25.8)	14.3 (6.6-22.3)	23.3 (16.0-30.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	21.8 (16.2-27.5)	19.7 (12.7-26.7)	23.7 (17.3-30.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.2 (6.9-11.6)	7.5 (5.0-10.0)	10.7 (7.2-14.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	40.8 (33.6-48.0)	40.9 (31.9-49.8)	40.7 (33.0-48.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	62.8 (54.2-71.4)	61.8 (52.5-71.1)	63.8 (53.4-74.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	57.0 (48.4-65.6)	54.2 (43.9-64.4)	59.5 (50.3-68.7)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการผลิตตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	4.0 (1.6-6.6)	4.3 (1.9-6.9)	3.7 (0.8-6.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	14.0 (8.4-19.6)	-	14.0 (8.4-19.6)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	37.7 (27.8-47.6)	-	37.7 (27.8-47.6)

คำจำกัดความ

- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 42 ของประเทศ มีพื้นที่ 5,196.46 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,001 คน	เพศชาย 945 คน	เพศหญิง 1,056 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 653,006 คน	เพศชาย 322,188 คน	เพศหญิง 330,817 คน

16.0% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	22.0% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	8.2% ภาวะอ้วน
18.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
25.2% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	87.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
18.5% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	86.1% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.6% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	89.6% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	79.1 (76.4-81.8)	79.5 (75.8-83.2)	78.7 (75.7-81.6)
- ประกันสังคม	12.0 (9.8-14.2)	14.2 (11.2-17.2)	9.9 (7.5-12.4)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	6.3 (4.2-8.3)	6.2 (3.8-8.6)	6.4 (3.3-9.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	4.0 (2.8-5.2)	2.7 (1.6-3.8)	5.2 (3.4-7.0)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.0 (0.5-1.5)	0.6 (0.0-1.4)	1.3 (0.5-2.0)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	22.0 (19.3-24.7)	18.5 (14.3-22.9)	25.3 (21.7-29.0)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	8.2 (5.3-11.0)	6.5 (2.4-10.6)	9.9 (7.4-12.4)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	36.1 (30.6-41.6)	20.4 (15.5-25.3)	51.6 (44.3-58.8)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	16.0 (13.4-18.6)	31.0 (25.6-36.3)	2.0 (1.2-2.8)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	18.1 (15.8-20.4)	26.4 (22.9-29.9)	10.1 (7.4-12.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.8 (4.4-7.3)	10.6 (7.8-13.3)	1.3 (0.4-2.2)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.1 (3.5-6.7)	7.9 (5.4-10.3)	2.4 (1.2-3.6)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	20.8 (15.2-26.4)	18.7 (12.4-24.9)	22.8 (16.5-29.1)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	67.1 (63.5-70.8)	74.8 (70.8-78.9)	59.6 (55.0-64.2)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	65.2 (59.9-70.6)	71.8 (66.2-77.4)	58.8 (53.0-64.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	25.2 (20.8-29.6)	22.5 (17.0-28.1)	27.3 (21.4-33.3)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	18.5 (15.1-21.8)	16.2 (12.6-19.7)	20.4 (16.5-24.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.6 (7.7-13.4)	6.3 (3.9-8.7)	13.6 (9.3-18.0)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.1 (54.8-63.5)	59.6 (53.9-65.3)	58.8 (53.1-64.5)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	40.5 (36.8-44.2)	36.3 (31.6-41.0)	44.6 (39.8-49.3)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.2 (19.5-24.8)	18.9 (15.5-22.4)	25.3 (21.7-28.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	34.7 (29.8-39.6)	30.5 (25.3-35.7)	38.8 (32.8-44.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.7 (54.7-64.6)	53.6 (48.3-58.9)	65.7 (60.0-71.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	44.5 (40.1-48.9)	36.8 (32.4-41.3)	51.9 (46.3-57.6)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	19.0 (16.1-22.0)	-	19.0 (16.1-22.0)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	23.2 (19.3-27.1)	20.1 (16.0-24.1)	26.1 (21.2-31.0)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	19.3 (15.8-22.9)	17.3 (14.1-20.4)	21.2 (16.5-25.8)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	6.5 (2.9-10.0)	12.8 (5.4-20.2)	0.8 (0.0-2.5)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	8.7 (1.8-15.7)	10.9 (0.9-20.9)	6.4 (1.7-11.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	29.9 (25.6-34.2)	27.6 (20.8-34.3)	31.6 (25.7-37.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	24.2 (20.0-28.4)	21.8 (17.1-26.5)	26.2 (21.5-30.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.7 (8.6-14.7)	7.9 (5.0-10.7)	14.4 (10.1-18.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	42.7 (37.6-47.9)	37.2 (31.4-43.1)	47.6 (41-54.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	66.4 (61.0-71.8)	61.2 (55.2-67.2)	71.1 (65.2-77.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	54.5 (49.6-59.3)	45.9 (40.5-51.2)	62.3 (56.2-68.5)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	10.2 (6.7-13.7)	11.8 (6.7-16.9)	8.7 (5.5-11.9)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.4 (22.7-30.1)	-	26.4 (22.7-30.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	48.6 (42.7-54.4)	-	48.6 (42.7-54.4)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 32 มีพื้นที่ 6,367,62 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,036 คน

เพศชาย 1,016 คน

เพศหญิง 1,020 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 365,532 คน

เพศชาย 185,124 คน

เพศหญิง 180,408 คน

18.4% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	22.0% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	8.5% ภาวะอ้วน
19.0% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	8.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
23.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	94.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
17.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	96.7% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทายาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.5% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	83.9% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	80.6 (76.4-84.7)	81.9 (76.6-87.1)	79.2 (75.1-83.4)
- ประกันสังคม	12.1 (9.3-14.8)	11.6 (8.1-15.1)	12.6 (9.5-15.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	5.1 (2.8-7.4)	5.4 (2.4-8.5)	4.7 (2.4-7.0)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	5.4 (3.5-7.3)	4.5 (2.4-6.6)	6.4 (4.3-8.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.9 (0.3-1.5)	1.2 (0.4-2.0)	0.7 (0.0-1.2)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	22.0 (20.1-24.0)	20.4 (18.0-22.7)	23.7 (20.4-27.1)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	8.5 (7.0-10.0)	6.5 (4.9-8.2)	10.6 (8.7-12.5)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	34.4 (29.7-39.1)	19.5 (14.9-24.2)	49.7 (43.3-56.1)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	18.4 (15.3-21.5)	34.4 (29.2-39.6)	2.1 (0.7-3.6)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	19.0 (15.8-22.2)	33.3 (27.5-39.1)	4.4 (2.5-6.3)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2 (2.8-5.6)	7.9 (5.3-10.6)	0.3 (0.0-0.7)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	8.6 (5.7-11.4)	15.6 (10.0-21.2)	1.4 (0.6-2.1)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	33.9 (23.7-44.1)	30.7 (21.2-40.2)	37.2 (25.6-48.9)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	72.4 (66.8-78.1)	74.4 (68.9-79.8)	70.5 (64.1-76.9)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	79.7 (75.1-84.3)	82.0 (77.3-86.8)	77.3 (71.9-82.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	23.7 (18.7-28.7)	18.0 (12.5-23.5)	29.0 (23.5-34.4)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	17.0 (13.5-20.6)	15.5 (10.8-20.2)	18.6 (15.1-22.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.5 (7.4-11.5)	7.5 (4.3-10.8)	11.1 (9.1-13.1)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	71.7 (64.4-79.1)	71.2 (62.9-79.5)	72.2 (64.8-79.5)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	43.5 (35.6-51.4)	39.7 (30.8-48.6)	47.4 (39.7-55.2)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	20.4 (14.7-26.1)	18.2 (11.7-24.7)	22.6 (17.0-28.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.2 (24.3-34.0)	26.9 (20.9-32.9)	31.5 (26.2-36.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	69.8 (62.4-77.1)	66.2 (59.0-73.4)	73.3 (64.5-82.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	52.7 (46.0-59.6)	46.3 (38.8-53.7)	59.3 (52.0-66.6)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	11.9 (7.4-16.4)	-	11.9 (7.4-16.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	16.0 (12.5-19.6)	12.9 (8.7-17.1)	19.2 (15.3-23.1)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	13.5 (10.1-16.9)	10.7 (6.6-14.8)	16.3 (12.6-19.9)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	8.1 (4.6-11.7)	15.0 (8.8-21.3)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.0 (3.2-10.7)	9.7 (4.1-15.3)	3.6 (0.0-7.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.9 (21.2-32.6)	20.6 (13.8-27.5)	32.2 (26.6-37.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	22.4 (18.0-26.9)	20.7 (14.4-27.0)	24.0 (19.8-28.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.5 (8.3-12.8)	8.3 (4.8-11.9)	12.4 (10.3-14.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	37.8 (31.5-44.2)	35.4 (27.5-43.3)	40.1 (33.3-46.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	80.7 (73.0-88.4)	78.5 (70.5-86.5)	82.7 (74.0-91.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	69.2 (60.4-78.1)	63.2 (53.3-73.2)	74.8 (65.9-83.7)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	5.1 (2.6-7.6)	6.1 (2.4-9.9)	4.1 (1.9-6.5)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	15.7 (9.9-21.6)	-	15.7 (9.9-21.6)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	47.5 (38.3-56.8)	-	47.5 (38.3-56.8)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ มีพื้นที่ 10,322.89 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,103 คน

เพศชาย 1,067 คน

เพศหญิง 1,036 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 936,071 คน

เพศชาย 449,925 คน

เพศหญิง 486,146 คน

17.1% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	18.9% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	7.3% ภาวะอ้วน
27.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.0% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
26.2% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	88.5% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
16.1% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	95.3% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.2% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	94.9% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84.0 (78.0-90.0)	83.5 (75.6-91.4)	84.5 (79.5-89.4)
- ประกันสังคม	7.4 (5.1-9.6)	7.6 (4.0-11.1)	7.3 (5.0-9.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.7 (0.9-4.5)	2.7 (0.6-4.9)	2.7 (0.2-5.1)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	7.2 (2.9-11.5)	7.9 (2.2-13.7)	6.5 (2.7-10.3)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.4 (0.06-0.6)	0.1 (0.0-0.3)	0.6 (0.07-1.0)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	18.9 (15.2-22.5)	15.3 (10.7-19.9)	22.2 (18.0-26.2)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	7.3 (5.5-9.0)	5.3 (2.9-7.7)	9.1 (6.6-11.5)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	32.5 (27.0-38.1)	14.5 (10.2-18.8)	49.7 (42.1-57.3)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	17.1 (14.5-19.7)	34.9 (29.6-40.2)	1.0 (0.0-2.1)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	27.6 (23.1-32.2)	43.2 (36.4-50.0)	13.4 (9.0-17.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.9 (3.7-8.1)	11.3 (6.9-15.7)	1.0 (0.05-2.0)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.0 (10.8-19.2)	23.9 (16.7-31.2)	6.8 (3.9-9.7)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	36.3 (23.0-50.4)	33.8 (20.9-46.7)	39.3 (24.8-53.9)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	65.9 (60.1-71.6)	71.4 (64.9-77.8)	60.7 (53.8-67.6)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	71.2 (65.6-76.7)	74.4 (68.1-80.6)	68.2 (62.3-74.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.2 (21.0-31.3)	25.0 (16.2-33.7)	27.0 (19.9-34.2)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	16.1 (13.5-18.8)	12.5 (9.1-15.9)	19.0 (14.4-23.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.2 (7.4-13.1)	6.2 (3.0-9.4)	13.1 (9.2-17.1)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	83.8 (79.0-88.5)	82.5 (76.5-88.5)	84.8 (79.8-89.8)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	48.5 (39.2-57.7)	44.8 (34.1-55.5)	51.8 (42.6-61.0)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.5 (17.4-27.7)	17.9 (13.1-22.8)	26.8 (20.7-32.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.0 (20.2-31.8)	21.4 (14.5-28.4)	30.2 (23.9-36.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	71.2 (64.9-77.5)	64.5 (56.9-72.1)	77.3 (71.4-83.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	55.4 (48.2-62.5)	47.3 (38.4-56.2)	62.8 (56.0-69.5)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.5 (21.3-33.7)	-	27.5 (21.3-33.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	18.7 (12.8-24.5)	15.2 (9.4-21.0)	21.9 (15.4-28.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	14.4 (9.7-19.1)	10.0 (6.5-13.6)	18.4 (12.1-24.8)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	10.0 (3.8-16.2)	17.8 (6.8-28.9)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	21.7 (13.2-30.2)	32.8 (19.1-46.4)	8.5 (2.1-14.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	28.9 (24.3-33.4)	28.7 (18.4-39.1)	29.0 (22.5-35.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	21.1 (17.9-24.2)	16.6 (12.0-21.3)	24.4 (18.7-30.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.8 (8.7-14.8)	6.8 (3.7-9.9)	15.3 (10.8-19.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	33.3 (26.6-40.0)	28.6 (20.1-37.1)	37.4 (30.4-44.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	80.0 (74.5-85.4)	75.3 (69.1-81.5)	83.9 (77.5-90.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	69.0 (61.9-76.1)	59.8 (51.0-68.7)	76.7 (69.7-83.7)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	7.9 (1.2-14.6)	8.4 (2.1-14.9)	7.4 (0.0-14.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	37.8 (29.1-46.4)	-	37.8 (29.1-46.4)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	60.4 (53.0-67.7)	-	60.4 (53.0-67.7)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ มีพื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,030 คน	เพศชาย 1,024 คน	เพศหญิง 1,006 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 1,317,381 คน	เพศชาย 640,845 คน	เพศหญิง 676,536 คน

17.8% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.4% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	5.5% ภาวะอ้วน
26.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.0% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	17.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
20.0% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	84.2% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
12.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	96.4% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับทราบมาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.4% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	91.1% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	90.2 (87.2-93.3)	91.7 (88.2-95.2)	88.8 (85.4-92.2)
- ประกันสังคม	4.7 (3.0-6.4)	4.0 (2.3-5.9)	5.3 (2.9-7.7)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	1.9 (0.3-3.5)	1.7 (0.2-3.3)	2.0 (0.2-3.8)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	3.7 (2.1-5.4)	3.1 (1.0-5.1)	4.3 (2.5-6.2)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.1 (0.0-0.3)	0.09 (0.0-0.3)	0.2 (0.0-0.4)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.4 (18.9-24.0)	17.6 (14.4-20.8)	25.0 (21.3-28.7)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	5.5 (3.5-7.6)	4.3 (2.1-6.5)	6.7 (4.0-9.4)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	32.9 (28.0-37.9)	16.9 (11.6-22.3)	48.0 (40.9-55.2)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	17.8 (14.5-21.1)	35.4 (29.2-41.7)	1.1 (0.2-1.8)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	26.3 (22.1-30.5)	44.2 (37.0-51.3)	9.5 (6.5-12.5)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.0 (3.1-6.8)	9.3 (6.0-12.5)	0.9 (0.0-1.9)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	17.2 (13.3-21.0)	28.1 (21.5-34.8)	6.7 (3.9-9.6)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	19.7 (12.6-26.8)	16.9 (10.0-23.7)	22.4 (14.3-30.4)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	67.8 (62.7-73.0)	71.3 (66.0-76.7)	64.4 (58.7-70.1)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	77.3 (71.8-82.7)	79.2 (73.3-85.0)	75.5 (69.1-82.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	20.0 (15.4-24.3)	16.8 (12.7-20.9)	22.0 (15.6-28.4)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	12.0 (9.6-14.4)	9.7 (6.6-12.8)	14.0 (10.7-17.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.4 (8.4-12.4)	6.3 (3.6-9.1)	13.7 (10.8-16.7)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.3 (76.2-86.4)	81.1 (74.8-87.4)	81.5 (75.6-87.4)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.1 (55.5-62.7)	53.5 (48.8-58.2)	64.4 (59.8-68.9)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.9 (19.9-29.8)	20.6 (15.7-25.5)	28.9 (22.3-35.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	32.6 (26.9-38.2)	26.5 (19.6-33.3)	38.4 (32.5-44.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	78.4 (73.8-83.0)	73.3 (67.0-79.5)	83.3 (79.4-87.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	62.0 (56.8-67.2)	56.4 (49.3-63.5)	67.4 (63.0-71.7)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	20.6 (14.7-26.5)	-	20.6 (14.7-26.5)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	20.1 (15.1-25.1)	15.2 (11.2-19.1)	24.8 (18.2-31.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	15.9 (11.7-20.2)	11.3 (7.4-15.2)	20.2 (14.3-26.1)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	7.9 (2.7-13.2)	14.5 (6.0-23.1)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	23.1 (16.6-29.7)	30.1 (18.4-41.7)	14.9 (6.3-23.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	21.5 (17.1-25.9)	18.8 (14.2-23.3)	23.3 (17.4-29.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	15.8 (12.7-18.8)	12.8 (8.6-16.9)	18.5 (14.3-22.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.9 (9.6-14.2)	7.2 (4.0-10.4)	15.8 (12.4-19.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	42.8 (35.2-50.4)	35.5 (25.5-45.6)	49.4 (42.4-56.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	88.0 (83.0-93.2)	85.0 (78.4-91.5)	91.0 (86.0-95.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	78.7 (72.3-85.2)	74.5 (64.7-84.3)	82.6 (77.8-87.4)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการผลิตตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	5.8 (2.1-9.4)	7.0 (2.0-11.8)	4.7 (1.8-7.6)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.9 (19.7-36.1)	-	27.9 (19.7-36.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	60.2 (52.8-67.5)	-	60.2 (52.8-67.5)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ มีพื้นที่ 4,161.66 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,025 คน	เพศชาย 1,009 คน	เพศหญิง 1,016 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 373,430 คน	เพศชาย 182,418 คน	เพศหญิง 191,012 คน

20.1% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	20.9% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	5.3% ภาวะอ้วน
30.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.5% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	20.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
29.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	92.9% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
13.6% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	89.8% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
11.4% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	99.1% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	81.7 (77.0-86.4)	82.9 (77.6-88.1)	80.6 (75.2-86.1)
- ประกันสังคม	8.2 (6.2-10.2)	7.9 (5.5-10.4)	8.4 (5.8-11.0)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	4.7 (2.4-7.1)	4.7 (2.4-7.0)	4.7 (2.0-7.5)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	7.7 (5.0-10.4)	6.1 (3.8-8.5)	9.1 (5.6-12.7)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.3 (0.03-0.5)	0.3 (0.0-0.6)	0.3 (0.0-0.6)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	20.9 (18.8-23.0)	17.5 (14.1-20.8)	24.2 (20.7-27.6)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	5.3 (4.4-6.4)	3.9 (2.7-5.1)	6.8 (5.1-8.4)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	38.3 (35.2-41.4)	20.3 (16.7-23.9)	55.6 (51.6-59.6)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	20.1 (16.5-23.6)	40.6 (33.7-47.4)	0.5 (0.0-1.0)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	30.8 (27.0-34.5)	49.4 (44.3-54.4)	13.0 (9.2-16.7)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.5 (5.2-9.8)	14.6 (10.2-18.9)	0.7 (0.1-1.3)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	20.1 (16.4-23.7)	34.5 (29.0-40.0)	6.3 (3.7-8.9)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	32.0 (22.6-41.5)	29.2 (19.9-38.4)	34.7 (24.6-44.8)
ความชุกผู้ที่มีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ			
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	69.3 (64.3-74.3)	73.4 (68.7-78.1)	65.3 (59.0-71.6)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	73.4 (68.2-78.7)	76.8 (71.1-82.4)	70.2 (64.8-75.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	29.7 (25.1-34.2)	26.3 (19.7-32.9)	31.9 (25.9-37.9)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	13.6 (11.4-15.9)	10.7 (8.4-13.0)	16.3 (13.4-19.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.4 (8.6-14.2)	7.1 (4.8-9.4)	14.7 (10.7-18.7)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.8 (77.3-86.4)	81.7 (76.0-87.4)	81.9 (77.6-86.2)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	54.6 (49.6-59.7)	48.9 (42.0-55.7)	60.1 (55.6-64.7)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.1 (21.6-30.5)	17.6 (13.1-22.0)	34.2 (28.5-39.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.1 (23.8-30.4)	21.7 (17.7-25.7)	32.2 (28.4-35.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.3 (77.6-84.9)	75.7 (71.5-79.9)	86.5 (82.9-90.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	61.7 (57.6-65.8)	52.4 (47.3-57.5)	70.6 (66.5-74.8)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.1 (13.8-22.5)	-	18.1 (13.8-22.5)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	18.1 (14.9-21.3)	13.5 (10.9-16.2)	22.5 (18.2-26.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	15.6 (12.7-18.5)	10.7 (8.4-13.1)	20.3 (16.0-24.6)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	12.1 (5.7-18.4)	23.3 (12.0-34.5)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	29.1 (22.0-36.3)	45.2 (34.4-56.0)	12.2 (5.0-19.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	31.2 (26.5-35.9)	27.2 (20.2-34.2)	33.9 (27.5-40.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	17.7 (14.8-20.7)	14.1 (11.1-17.2)	20.8 (17.1-24.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.6 (9.6-15.6)	7.9 (5.3-10.5)	16.2 (12.0-20.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	36.1 (31.9-40.4)	29.7 (23.8-35.6)	41.9 (37.5-46.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	91.0 (88.3-93.8)	86.5 (82.8-90.3)	95.1 (92.8-97.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	79.7 (74.5-84.9)	69.7 (62.9-76.6)	88.6 (84.0-93.3)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	3.0 (1.8-4.3)	3.0 (1.3-4.7)	3.0 (1.2-5.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	25.0 (18.7-31.2)	-	25.0 (18.7-31.2)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	60.2 (53.9-66.5)	-	60.2 (53.9-66.5)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 11 ของประเทศ มีพื้นที่ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,024 คน	เพศชาย 986 คน	เพศหญิง 1,038 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 983,583 คน	เพศชาย 475,037 คน	เพศหญิง 508,546 คน

17.2% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	22.2% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	5.7% ภาวะอ้วน
23.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	14.3% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
18.5% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	89.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
11.6% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	97.0% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.4% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	99.5% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	90.2 (87.8-92.7)	89.8 (86.9-92.8)	90.7 (87.6-93.8)
- ประกันสังคม	5.0 (3.2-6.8)	4.8 (2.5-7.1)	5.1 (3.2-7.0)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	1.6 (0.7-2.5)	1.3 (0.2-2.4)	1.8 (0.5-3.1)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	2.7 (1.8-3.7)	3.1 (1.7-4.4)	2.4 (1.0-3.8)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.5 (0.02-0.9)	0.8 (0.0-1.7)	0.2 (0.0-0.5)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	22.2 (19.4-25.1)	17.1 (14.2-20.0)	27.1 (23.2-31.0)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	5.7 (4.3-7.1)	4.0 (2.5-5.5)	7.3 (5.0-9.7)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	40.0 (36.2-44.0)	21.1 (15.7-27.5)	58.1 (52.7-63.5)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	17.2 (14.3-20.1)	34.9 (29.4-40.5)	0.9 (0.01-1.8)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	23.6 (20.2-27.0)	39.3 (33.6-44.9)	9.5 (5.5-13.5)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.9 (3.4-6.3)	9.4 (6.7-12.1)	0.7 (0.05-1.4)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	14.3 (11.2-17.3)	23.9 (18.5-29.3)	5.2 (2.8-7.7)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	37.4 (27.4-47.3)	35.0 (25.5-44.6)	39.5 (28.8-50.2)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	73.6 (69.2-78.1)	76.7 (72.7-80.6)	70.8 (65.1-76.5)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	79.4 (74.9-84.0)	82.7 (78.6-86.8)	76.4 (70.2-82.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	18.5 (12.0-25.1)	14.2 (8.3-20.1)	21.6 (13.1-30.1)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	11.6 (9.3-13.8)	8.5 (6.3-10.9)	14.1 (11.2-17.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.4 (7.4-11.5)	7.1 (4.9-9.2)	11.3 (8.3-14.3)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.9 (76.3-87.4)	81.5 (74.8-88.3)	82.1 (76.4-87.8)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.9 (39.2-52.7)	42.2 (34.6-49.9)	49.2 (42.4-56.0)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีใช้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.9 (14.8-23.0)	15.9 (11.3-20.5)	21.7 (16.8-26.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.5 (19.6-29.4)	19.1 (14.2-24.1)	29.4 (23.6-35.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	70.6 (64.1-77.1)	65.8 (58.7-72.9)	74.9 (68.0-81.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.2 (53.5-64.8)	52.3 (46.2-58.5)	65.4 (59.2-71.7)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	28.5 (22.3-34.6)	-	28.5 (22.3-34.6)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	25.3 (19.5-31.0)	20.5 (15.4-25.6)	29.6 (22.3-36.9)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	21.5 (15.5-26.5)	15.9 (10.7-21.2)	26.6 (19.1-34.1)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	12.3 (6.0-18.7)	22.1 (11.5-32.7)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	21.0 (12.3-29.6)	32.6 (20.2-45.1)	6.6 (0.4-12.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	21.8 (14.5-29.0)	17.0 (10.8-23.2)	25.0 (15.6-34.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	15.6 (12.5-18.6)	11.7 (8.5-14.8)	18.9 (15.0-22.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.0 (8.7-13.3)	8.4 (5.9-10.8)	13.2 (9.7-16.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	31.3 (25.5-37.0)	25.6 (18.9-32.2)	36.2 (29.7-42.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	80.3 (74.7-85.8)	76.8 (71.1-82.5)	83.3 (76.4-90.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	75.8 (69.5-82.1)	71.1 (64.1-78.2)	79.9 (73.0-86.7)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	4.9 (1.9-8.0)	4.0 (0.6-7.6)	5.7 (2.5-9.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	38.7 (30.5-46.8)	-	38.7 (30.5-46.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	69.8 (64.2-75.3)	-	69.8 (64.2-75.3)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ มีพื้นที่ 8,299.45 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,053 คน

เพศชาย 1,016 คน

เพศหญิง 1,037 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 829,682 คน

เพศชาย 401,331 คน

เพศหญิง 428,351 คน

13.5% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.1% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	5.6% ภาวะอ้วน
23.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	13.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
27.2% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	89.0% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
13.1% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	91.8% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.6% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	95.7% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84.5 (79.2-89.8)	84.1 (77.2-91.1)	84.8 (80.4-89.2)
- ประกันสังคม	4.5 (2.5-6.4)	4.5 (1.7-7.2)	4.4 (2.3-6.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.8 (1.3-4.2)	2.4 (1.1-3.7)	3.1 (1.4-4.9)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	5.8 (2.5-9.1)	5.6 (2.2-9.0)	5.9 (2.4-9.5)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	1.0 (0.2-1.8)	1.0 (0.2-1.8)	1.0 (0.05-1.9)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.2 (18.7-23.8)	18.6 (15.6-21.6)	23.6 (20.4-26.8)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	5.6 (4.5-6.7)	3.5 (1.7-5.2)	7.6 (5.8-9.3)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	34.1 (30.1-38.0)	16.9 (12.6-21.2)	50.1 (45.2-55.0)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	13.5 (11.0-16.0)	27.1 (21.6-32.5)	0.8 (0.1-1.5)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	23.9 (18.9-28.9)	38.6 (31.3-45.9)	10.1 (6.3-14.0)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.8 (3.0-6.5)	9.4 (6.2-12.7)	0.4 (0.0-1.0)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	13.9 (9.9-17.9)	23.1 (16.7-29.4)	5.2 (2.9-7.7)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	54.0 (43.9-64.0)	52.2 (42.3-62.1)	55.6 (44.8-66.5)
ความชุกผู้ที่มีการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ			
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่าดีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	70.6 (64.5-76.8)	72.4 (66.0-78.8)	69.0 (62.1-75.8)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	79.9 (73.5-86.3)	81.3 (75.8-86.7)	78.6 (70.4-86.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	27.2 (21.6-32.8)	28.2 (20.4-35.9)	26.4 (20.0-32.7)

ความทุกข์ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	13.1 (10.1-16.0)	10.7 (7.4-14.1)	15.2 (11.4-18.9)
ความทุกข์ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.6 (7.7-13.4)	9.4 (5.3-13.4)	11.6 (8.0-15.3)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความทุกข์ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	83.9 (79.2-88.5)	84.7 (81.1-88.2)	83.2 (76.2-90.2)
ความทุกข์ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	45.2 (39.2-51.2)	41.1 (34.0-48.3)	49.1 (42.7-55.6)
ความทุกข์ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.4 (17.2-27.6)	19.3 (15.1-23.5)	25.2 (18.5-31.9)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.4 (19.8-29.0)	23.6 (17.6-29.6)	25.2 (20.5-29.8)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.5 (64.6-80.3)	69.5 (63.3-75.7)	75.2 (65.0-85.5)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	59.7 (51.9-67.5)	58.1 (51.3-64.9)	61.2 (51.1-71.3)
ความทุกข์สตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	17.4 (13.3-21.5)	-	17.4 (13.3-21.5)
ความทุกข์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	12.5 (9.5-15.6)	10.3 (6.6-14.0)	14.6 (11.6-17.6)
ความทุกข์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	9.0 (6.5-11.5)	7.3 (4.9-9.7)	10.5 (7.3-13.8)
ค่าประมาณความทุกข์ของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความทุกข์มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	7.6 (3.2-12.0)	13.2 (5.5-20.9)	-
ความทุกข์มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.2 (8.5-22.0)	20.9 (11.6-30.3)	7.5 (0.2-14.7)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	29.8 (24.0-35.6)	30.2 (22.2-38.2)	29.4 (22.9-35.7)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	16.9 (13.4-20.4)	13.9 (10.0-17.9)	19.4 (14.5-24.1)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	12.4 (9.1-15.7)	11.0 (6.4-15.7)	13.6 (9.5-17.7)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	30.3 (24.7-35.8)	29.7 (22.4-36.9)	30.8 (25.0-36.6)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	79.7 (70.2-89.3)	77.9 (69.3-86.5)	81.4 (70.5-92.3)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	70.6 (60.4-80.8)	69.7 (60.7-78.7)	71.3 (59.0-83.6)
ความทุกข์มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	4.6 (2.0-7.1)	4.2 (0.4-8.0)	4.8 (1.5-8.2)
ความทุกข์สตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.1 (16.7-27.5)	-	22.1 (16.7-27.5)
ความทุกข์สตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	52.1 (44.0-60.1)	-	52.1 (44.0-60.1)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ มีพื้นที่ 8,124.06 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,093 คน

เพศชาย 1,038 คน

เพศหญิง 1,055 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 826,300 คน

เพศชาย 395,179 คน

เพศหญิง 431,121 คน

18.2% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	18.3% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	4.5% ภาวะอ้วน
27.0% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.4% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.9% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
21.8% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	83.6% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
11.3% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	84.7% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
8.0% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	85.0% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	89.0 (86.1-92.0)	89.0 (86.1-92.0)	87.5 (84.2-90.8)
- ประกันสังคม	5.1 (3.1-7.1)	4.9 (2.6-7.2)	5.2 (2.8-7.7)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.0 (0.5-3.5)	2.7 (0.8-4.5)	1.5 (0.0-2.9)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	2.8 (1.1-4.4)	2.0 (0.2-3.7)	3.5 (1.6-5.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.3 (0.04-0.6)	0.2 (0.0-0.4)	0.4 (0.05-0.8)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	18.3 (14.5-22.0)	14.2 (10.2-18.3)	22.0 (17.3-26.6)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	4.5 (2.8-6.3)	2.9 (1.2-4.7)	6.0 (3.1-8.9)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	30.9 (26.3-35.6)	13.3 (9.0-17.5)	46.8 (40.5-53.0)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	18.2 (14.5-21.8)	37.7 (30.4-45.1)	0.9 (0.2-1.6)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	27.0 (22.8-31.3)	45.8 (38.7-52.9)	10.2 (6.4-14.1)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.4 (2.7-8.1)	10.8 (5.4-16.3)	0.6 (0.0-1.1)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.9 (11.5-20.2)	28.2 (20.2-36.1)	4.6 (2.7-6.4)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	26.4 (16.3-36.4)	26.8 (15.9-37.7)	26.0 (15.9-36.1)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	65.1 (57.8-72.3)	67.8 (61.4-74.2)	62.6 (53.9-71.3)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	67.7 (58.7-76.7)	70.3 (62.2-78.4)	65.3 (55.2-75.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	21.8 (16.5-27.0)	17.7 (11.3-24.1)	25.0 (18.4-31.6)

ความทุกข์ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	11.3 (8.6-14.0)	8.7 (5.7-11.6)	13.6 (10.3-16.9)
ความทุกข์ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	8.0 (5.3-10.7)	6.5 (3.9-9.1)	9.3 (6.1-12.4)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความทุกข์ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	75.1 (66.9-83.3)	74.4 (65.5-83.3)	75.6 (66.9-84.3)
ความทุกข์ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	48.4 (39.3-57.4)	41.9 (33.0-50.8)	54.3 (44.3-64.3)
ความทุกข์ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	15.0 (11.1-18.9)	12.2 (8.2-16.1)	17.6 (12.5-22.8)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.3 (16.4-32.1)	23.4 (14.6-32.3)	25.0 (17.3-32.7)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	74.6 (63.2-86.1)	69.7 (56.9-82.5)	79.1 (68.5-89.7)
ความทุกข์ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	62.3 (51.3-73.4)	56.8 (44.2-69.3)	67.4 (57.2-77.5)
ความทุกข์สตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	31.3 (20.9-41.6)	-	31.3 (20.9-41.6)
ความทุกข์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	18.8 (13.8-23.8)	15.7 (10.4-20.9)	21.6 (15.2-28.0)
ความทุกข์ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	14.1 (10.0-18.0)	11.6 (7.4-15.7)	16.2 (11.6-20.9)

ค่าประมาณความทุกข์ของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความทุกข์มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	7.3 (1.8-12.7)	13.6 (3.6-23.5)	
ความทุกข์มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	13.8 (7.0-20.6)	25.7 (13.0-38.3)	0.3 (0.0-0.85)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	25.2 (20.0-30.4)	21.6 (14.6-28.5)	27.8 (21.0-34.6)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	14.3 (11.1-17.5)	11.0 (7.4-14.6)	17.1 (12.9-21.4)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.5 (6.5-12.5)	7.8 (4.5-11.1)	10.8 (7.5-14.2)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	29.6 (20.6-38.6)	27.3 (18.2-36.5)	31.7 (22.3-41.1)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	83.2 (73.4-93.0)	77.5 (64.4-90.6)	88.3 (81.7-95.0)
ความทุกข์มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.6 (62.2-83.0)	65.1 (51.2-78.9)	79.4 (72.1-86.7)
ความทุกข์มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	5.7 (2.3-9.1)	7.2 (0.6-13.7)	4.4 (1.9-6.9)
ความทุกข์สตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	44.0 (30.6-57.4)	-	44.0 (30.6-57.4)
ความทุกข์สตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	75.9 (68.2-83.5)	-	75.9 (68.2-83.5)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 18 ของประเทศ มีพื้นที่ 9,942.50 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,033 คน

เพศชาย 1,017 คน

เพศหญิง 1,016 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 1,193,076 คน

เพศชาย 583,662 คน

เพศหญิง 609,414 คน

27.9% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	23.4% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	9.2% ภาวะอ้วน
19.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
27.8% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	94.1% ของผู้ทราบบัวระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
13.6% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	94.7% ของผู้ทราบบัวมีภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
9.7% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	98.4% ของผู้ทราบบัวมีโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	90.6 (86.7-94.4)	91.2 (88.0-94.5)	90.0 (84.6-95.4)
- ประกันสังคม	3.3 (1.9-4.7)	2.9 (1.2-4.7)	3.7 (1.8-5.5)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	2.8 (1.4-4.1)	3.9 (1.7-6.2)	1.6 (0.6-2.7)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	4.0 (1.9-6.2)	4.0 (1.9-6.0)	4.1 (1.3-6.8)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.1 (0.0-0.2)	0.08 (0.0-0.2)	0.2 (0.0-0.3)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	23.4 (19.4-27.4)	18.4 (14.1-22.7)	28.2 (23.2-33.2)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	9.2 (6.7-11.7)	7.2 (4.9-9.5)	11.1 (7.1-15.1)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	44.2 (40.2-48.3)	27.5 (22.5-32.6)	60.2 (53.6-66.9)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	27.9 (25.6-30.2)	54.4 (50.6-58.2)	2.1 (0.5-3.7)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	19.6 (17.4-21.8)	37.4 (32.8-42.1)	2.6 (1.1-4.0)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	5.8 (4.1-7.5)	11.4 (7.8-15.1)	0.4 (0.0-0.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	3.5 (2.5-4.7)	6.8 (4.4-9.1)	0.5 (0.0-1.2)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	57.4 (52.7-62.0)	52.6 (45.8-59.3)	62.0 (56.9-67.1)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	72.5 (69.3-75.7)	74.7 (71.1-78.3)	70.4 (66.0-74.8)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	88.2 (85.4-91.0)	92.0 (89.3-94.6)	84.5 (80.4-88.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	27.8 (24.0-31.6)	26.6 (20.9-32.3)	28.6 (24.1-33.2)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	13.6 (12.0-15.2)	12.2 (10.3-14.1)	14.9 (12.8-17.0)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	9.7 (6.9-12.6)	9.7 (5.5-13.8)	9.8 (6.9-12.6)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	67.8 (59.5-76.1)	70.1 (63.9-76.3)	66.0 (54.1-77.9)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	26.0 (22.0-29.8)	25.3 (19.9-30.8)	26.6 (22.1-31.0)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	22.5 (18.7-26.3)	18.2 (13.8-22.6)	26.7 (21.7-31.6)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	38.9 (34.8-42.9)	33.5 (29.7-37.3)	44.0 (37.8-50.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	77.8 (74.6-81.1)	74.1 (69.9-78.4)	81.4 (77.5-85.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	60.6 (56.2-65.0)	51.5 (45.1-57.8)	69.3 (64.9-73.8)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	32.0 (27.2-36.7)	-	32.0 (27.2-36.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	23.1 (19.4-26.8)	16.8 (13.8-19.8)	29.1 (24.0-34.2)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	16.8 (13.8-19.8)	11.2 (8.5-13.8)	22.0 (18.3-25.7)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	15.5 (10.3-20.7)	26.0 (18.0-34.1)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	13.0 (2.4-23.5)	20.7 (3.7-37.6)	1.9 (0.0-5.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	30.6 (26.5-34.6)	29.6 (24.4-34.9)	31.2 (25.7-36.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	18.1 (16.0-20.1)	16.7 (14.0-19.4)	19.2 (16.5-22.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.9 (7.6-14.2)	12.1 (6.9-17.3)	10.0 (6.7-13.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	49.9 (45.8-54.0)	44.7 (39.3-50.0)	54.3 (48.7-60.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	85.6 (82.2-89.0)	82.0 (77.2-86.9)	88.6 (85.6-91.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.7 (67.9-77.6)	63.2 (56.6-69.9)	80.8 (76.0-85.6)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	3.0 (1.9-4.2)	2.9 (1.2-4.7)	3.1 (1.2-5.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	41.6 (35.5-47.6)	-	41.6 (35.5-47.6)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	70.7 (65.9-75.5)	-	70.7 (65.9-75.5)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 64 ของประเทศ มีพื้นที่ 2,478.98 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,006 คน	เพศชาย 995 คน	เพศหญิง 1,011 คน
ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 207,990 คน	เพศชาย 104,371 คน	เพศหญิง 103,619 คน

17.4% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	16.7% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	1.9% ภาวะอ้วน
7.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	0.0% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	0.15% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
12.4% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	89.3% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
11.5% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	97.3% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
1.7% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	79.5% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานและทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	82.8 (77.3-88.3)	81.8 (74.8-88.8)	83.8 (76.3-91.3)
- ประกันสังคม	12.4 (7.7-17.1)	14.3 (8.3-20.3)	10.5 (4.5-16.5)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	1.1 (0.3-1.9)	1.6 (0.3-3.0)	0.6 (0.0-1.2)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	2.5 (1.1-3.9)	2.2 (0.7-3.7)	2.8 (1.1-4.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.2 (0.0-0.3)	0.2 (0.0-0.5)	0.1 (0.0-0.4)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	16.7 (10.5-22.9)	16.9 (10.2-23.6)	16.4 (9.6-23.3)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	1.9 (0.5-3.3)	2.0 (0.0-4.6)	2.0 (0.5-3.1)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	32.4 (19.2-45.6)	22.4 (8.4-36.3)	44.2 (30.6-57.8)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	17.4 (14.0-20.8)	33.7 (26.6-40.8)	1.0 (0.2-1.8)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	7.1 (4.7-9.5)	13.5 (8.9-18.2)	0.6 (0.0-1.4)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	-	-	-
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	0.15 (0.0-0.32)	0.3 (0.0-0.63)	0.01 (0.0-0.03)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	12.9 (5.6-20.2)	12.8 (4.8-20.8)	13.0 (5.7-20.4)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	83.5 (78.4-88.6)	82.8 (77.4-88.3)	84.1 (78.8-89.4)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	79.6 (75.5-83.7)	77.8 (72.5-83.2)	81.4 (77.4-85.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	12.4 (8.3-16.5)	15.9 (10.0-21.8)	9.0 (6.0-12.1)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	11.5 (7.6-15.4)	12.5 (8.2-16.7)	10.5 (6.7-14.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	1.7 (0.9-2.5)	1.8 (0.7-2.8)	1.7 (0.4-3.0)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	40.4 (28.0-52.8)	37.4 (24.4-50.3)	43.4 (30-55.9)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	10.4 (3.3-17.6)	10.5 (2.8-18.3)	10.4 (2.8-17.9)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	2.9 (0.6-5.1)	3.9 (0.3-7.5)	1.8 (0.0-3.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	66.2 (55.0-77.4)	67.0 (55.7-78.3)	65.4 (53.5-77.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	73.8 (63.7-83.9)	73.6 (63.2-84.0)	74.1 (63.7-84.4)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	69.1 (59.2-79.1)	69.2 (59.4-78.9)	69.0 (58.3-79.9)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	7.4 (0.4-14.4)	-	7.4 (0.4-14.4)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	35.7 (24.0-47.3)	41.1 (28.0-54.2)	30.0 (19.1-41.0)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	27.8 (17.6-37.9)	32.3 (20.6-44.0)	23.3 (14.1-32.4)
ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	15.8 (9.2-22.4)	30.7 (18.1-43.3)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2 (1.3-7.0)	6.2 (1.0-11.3)	2.0 (0.0-5.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	19.3 (13.5-25.2)	24.4 (17.0-31.8)	14.2 (9.5-18.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	20.2 (13.8-26.6)	21.6 (14.8-28.4)	18.9 (12.4-25.4)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	2.7 (1.4-4.1)	3.1 (1.3-4.9)	2.4 (0.3-4.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	74.3 (63.8-84.8)	76.8 (66.5-87.2)	71.9 (60.0-83.8)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	81.9 (73.1-90.9)	82.4 (73.4-91.4)	81.6 (71.7-91.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	76.7 (67.8-85.5)	77.8 (69.3-86.3)	75.5 (65.3-85.8)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	2.5 (1.3-3.7)	4.1 (1.8-6.3)	1.0 (0.07-2.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	8.1 (0.0-16.9)	-	8.1 (0.0-16.9)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	58.8 (48.6-69.0)	-	58.8 (48.6-69.0)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 59 ของประเทศ มีพื้นที่ 3,298.05 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,126 คน

เพศชาย 1,041 คน

เพศหญิง 1,085 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 198,660 คน

เพศชาย 100,518 คน

เพศหญิง 98,142 คน

26.0% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.0% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	8.5% ภาวะอ้วน
15.8% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.6% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
24.7% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	93.1% ของผู้ทราบว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
16.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	97.5% ของผู้ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงและรับประทานยาจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
7.0% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	92.3% ของผู้ทราบว่ามีโรคเบาหวานทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	85.7 (81.6-89.8)	85.3 (80.3-90.3)	86.2 (82.5-89.9)
- ประกันสังคม	6.2 (3.4-8.9)	6.8 (3.2-10.4)	5.5 (3.3-7.8)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	4.9 (2.5-7.2)	5.0 (2.5-7.5)	4.7 (2.2-7.3)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	6.6 (4.4-8.7)	6.6 (3.8-9.2)	6.6 (4.4-8.7)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.3 (0.0-0.6)	0.4 (0.0-1.0)	0.1 (0.0-0.3)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	21.0 (18.8-23.1)	17.0 (14.6-19.3)	25.0 (21.3-28.7)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	8.5 (6.0-11.0)	5.6 (3.2-8.0)	11.5 (8.4-14.5)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	40.0 (37.1-42.8)	22.9 (19.1-26.7)	57.2 (53.9-60.5)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	26.0 (23.3-28.6)	49.2 (44.5-53.9)	2.8 (1.6-4.1)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.8 (12.2-19.3)	26.5 (20.7-32.4)	4.7 (2.8-6.7)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.6 (3.0-6.2)	8.6 (5.6-11.5)	0.5 (0.0-1.1)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2 (2.8-5.6)	7.8 (5.2-10.3)	0.6 (0.09-1.0)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	32.0 (23.9-40.1)	28.6 (20.0-37.3)	35.4 (27.1-43.7)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	70.3 (66.1-74.4)	71.3 (65.8-76.7)	69.2 (65.2-73.3)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	85.0 (81.1-88.8)	86.3 (82.0-90.6)	83.7 (79.6-87.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	24.7 (19.7-29.6)	21.4 (16.5-26.3)	27.3 (21.2-33.5)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	16.0 (14.0-18.0)	14.6 (11.9-17.2)	17.4 (15.1-19.8)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	7.0 (5.7-8.3)	6.2 (4.3-8.0)	7.8 (5.7-9.9)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	68.9 (63.1-74.7)	66.2 (59.2-73.1)	71.5 (65.1-77.9)
ความชุกผู้ที่ได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	32.1 (26.6-37.6)	29.8 (24.0-35.6)	34.5 (28.6-40.3)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	18.3 (14.8-21.8)	14.5 (10.5-18.5)	22.3 (17.8-26.7)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	28.6 (24.9-32.4)	24.9 (21.3-28.5)	32.5 (27.7-37.3)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	78.9 (74.8-82.9)	77.6 (71.9-83.4)	80.1 (75.3-84.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	65.8 (61.3-70.3)	62.9 (57.2-68.6)	68.7 (63.3-74.2)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	17.5 (12.2-22.8)	-	17.5 (12.2-22.8)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	12.8 (10.4-15.3)	10.3 (8.2-12.3)	15.5 (12.1-18.9)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	9.4 (6.7-12.0)	7.3 (5.0-9.6)	11.5 (8.0-15.0)

ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	14.0 (8.4-19.5)	25.5 (15.2-35.7)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	2.8 (0.2-5.3)	3.2 (0.1-6.4)	2.3 (0.0-5.3)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	27.4 (22.4-32.3)	23.4 (18.0-28.7)	30.7 (24.5-36.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	21.1 (18.4-23.7)	19.1 (15.5-26.1)	22.9 (19.7-26.1)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	8.2 (6.7-9.7)	7.2 (5.1-9.3)	9.1 (6.6-11.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	38.2 (32.7-43.6)	34.3 (28.5-40.2)	42.0 (34.9-49.0)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	89.4 (86.0-92.7)	86.9 (81.9-92.0)	91.8 (87.9-95.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	83.5 (78.6-88.3)	81.5 (75.7-87.4)	85.3 (79.8-90.9)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	4.2 (2.1-6.3)	3.0 (1.1-4.9)	5.4 (1.7-9.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.1 (17.2-31.1)	-	24.1 (17.2-31.1)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	58.6 (50.7-66.4)	-	58.6 (50.7-66.4)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศ มีพื้นที่ 4,917.52 ตารางกิโลเมตร

จำนวนตัวอย่างสำรวจอายุ 15-79 ปี 2,018 คน

เพศชาย 1,011 คน

เพศหญิง 1,007 คน

ประมาณการประชากรอายุ 15-79 ปี 488,752 คน

เพศชาย 236,226 คน

เพศหญิง 252,526 คน

21.8% สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	23.4% ภาวะน้ำหนักตัวเกิน	12.6% ภาวะอ้วน
19.4% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.5% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา
26.9% ทราบว่าตนเองมีระดับไขมันในเลือดสูง	90.9% ของผู้ทราบว่าระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือด	
18.0% ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	91.3% ของผู้ทราบว่าภาวะความดันโลหิตสูงและรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิต	
10.2% ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน	88.8% ของผู้ทราบว่าโรคเบาหวานทราบระดับน้ำตาลของตนเอง	

ค่าประมาณความชุกของประชากรอายุ 15-79 ปี	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้ที่ทราบว่าตนเองมีประกันสุขภาพ			
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	84.1 (81.0-87.2)	86.0 (82.4-89.5)	82.4 (79.1-85.6)
- ประกันสังคม	7.5 (5.5-9.5)	7.5 (5.7-9.3)	7.5 (4.5-10.6)
- ประกันสุขภาพกับเอกชน	3.3 (2.1-4.4)	3.0 (1.7-4.4)	3.5 (2.0-5.0)
- สวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	5.8 (4.0-7.5)	4.2 (2.4-5.9)	7.3 (5.2-9.4)
- สวัสดิการรักษายาบาลของรัฐวิสาหกิจ	0.2 (0.05-0.4)	0.03 (0.0-0.08)	0.4 (0.08-0.7)
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Behavioral Risk factors)			
ความชุกผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ระหว่าง 25.0-29.9 Kg/m ²)	23.4 (21.2-25.6)	22.6 (19.4-25.7)	24.1 (20.9-27.3)
ความชุกผู้มีภาวะอ้วน (BMI เท่ากับหรือมากกว่า 30 Kg/m ²)	12.6 (10.5-14.7)	7.6 (5.6-9.8)	17.2 (14.1-20.3)
ความชุกผู้ชายมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 90 เซนติเมตร หรือผู้หญิงมีรอบเอวเท่ากับหรือมากกว่า 80 เซนติเมตร	47.6 (42.7-52.5)	31.6 (24.8-38.4)	62.3 (57.1-67.6)
ความชุกผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน	21.8 (18.9-24.7)	43.8 (38.0-49.6)	1.4 (0.6-2.2)
ความชุกผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 30 วันที่ผ่านมา	19.4 (16.1-22.6)	35.4 (29.9-40.9)	4.4 (2.0-6.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.5 (3.2-5.9)	8.9 (6.2-11.6)	0.4 (0.0-0.8)
ความชุกผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink ใน 30 วันที่ผ่านมา	4.2 (2.9-5.5)	7.9 (5.3-10.5)	0.7 (0.0-1.5)
ความชุกผู้ที่รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับหรือมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานใน 7 วันที่ผ่านมา	41.5 (34.6-48.4)	35.1 (27.3-43.0)	47.0 (40.1-53.9)
สถานะสุขภาพ (Health Status)			
ความชุกผู้ประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี / ดีมาก / ดีเยี่ยม	61.1 (56.2-65.9)	67.4 (62.3-72.4)	55.2 (49.5-60.9)
ความชุกผู้ประเมินตนเองไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้ง 5 ด้าน (EQ5D)	69.3 (65.6-72.9)	73.8 (70.0-77.6)	65.1 (60.6-69.5)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	26.9 (19.7-34.1)	24.2 (16.5-31.9)	29.1 (21.7-36.6)

ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	18.0 (14.9-21.3)	15.6 (11.7-19.6)	20.2 (16.5-23.9)
ความชุกผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	10.2 (7.1-13.3)	7.7 (5.2-10.2)	12.4 (8.0-16.7)
การใช้บริการสุขภาพ (Health Utilization)			
ความชุกผู้ที่รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งต่อบริการสุขภาพที่ได้รับใน 12 เดือนที่ผ่านมา	72.3 (67.5-77.0)	71.9 (65.7-78.0)	72.6 (67.1-78.1)
ความชุกผู้ที่ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผ่านมา	52.3 (47.3-57.3)	49.1 (43.3-54.9)	55.3 (49.8-60.8)
ความชุกผู้ที่ได้พบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจฟันที่มีไข้การรักษาใน 12 เดือนที่ผ่านมา	24.2 (20.7-27.8)	17.6 (12.8-22.3)	30.5 (26.7-34.2)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	46.5 (41.6-51.4)	41.4 (37.0-45.7)	51.3 (45.5-57.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	76.1 (72.2-80.0)	72.2 (67.1-77.2)	79.7 (75.4-84.1)
ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	66.1 (60.8-71.4)	62.3 (55.7-68.9)	69.7 (64.3-75.2)
ความชุกสตรีอายุ 15-79 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	27.8 (21.9-33.7)	-	27.8 (21.9-33.7)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา	32.9 (28.1-37.6)	29.2 (23.5-34.9)	36.2 (30.7-41.8)
ความชุกผู้ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา	19.6 (14.7-24.4)	16.5 (10.9-22.1)	22.3 (17.5-27.1)
ค่าประมาณความชุกของกลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวัง	รวม (95%CI)	เพศชาย (95%CI)	เพศหญิง (95%CI)
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน	7.8 (2.9-12.7)	14.9 (5.0-24.8)	-
ความชุกผู้มีอายุ 15-19 ปี มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา	15.1 (7.0-23.2)	20.5 (9.9-31.0)	9.2 (0.0-19.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ	30.8 (23.2-38.3)	28.1 (19.9-36.3)	32.7 (24.8-40.6)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง	24.3 (20.3-28.3)	21.7 (17.2-26.3)	26.4 (21.6-31.2)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวาน	11.9 (8.5-15.3)	9.0 (6.5-11.5)	14.2 (8.9-19.5)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดไขมันในเลือดโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	58.6 (53.7-63.5)	52.5 (47.8-57.2)	63.8 (57.6-69.9)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากบุคลากรด้านสาธารณสุขใน 12 เดือนที่ผ่านมา	86.1 (82.7-89.4)	83.5 (79.5-87.6)	88.2 (84.7-91.7)
ความชุกผู้มีอายุ 35-79 ปี ที่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานใน 12 เดือนที่ผ่านมา	79.0 (74.1-83.9)	74.3 (67.0-81.7)	83.0 (78.3-87.7)
ความชุกผู้มีอายุ 45-79 ปี มีการพลัดตก หกล้ม และได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ใน 6 เดือนที่ผ่านมา	5.4 (3.1-7.7)	5.9 (2.8-9.1)	4.8 (2.8-6.8)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกใน 12 เดือนที่ผ่านมา	36.5 (28.1-45.0)	-	36.5 (28.1-45.0)
ความชุกสตรีอายุ 35-69 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	64.7 (58.6-70.8)	-	64.7 (58.6-70.8)

คำจำกัดความ

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Heavy Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน ใน 30 วันที่ผ่านมา
2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge Drink หมายถึง ผู้ชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง หรือผู้หญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วมาตรฐานต่อครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 ตารางรายงานผลการสำรวจประเด็นสำคัญและประเด็นใหม่ในการสำรวจฯ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 ค่าประมาณความชุกของผู้มีกิจกรรมทางกายหรือได้ออกกำลังกายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมิน 2011 BRFSS Physical Activity Questions)

จังหวัด	ผู้ที่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ขั้นสูง			ผู้ที่ได้ออกกำลังกายเพียงพอ			ผู้ที่ได้ออกกำลังกายแต่ไม่เพียงพอ			ผู้ที่มีการทำงานปกติและไม่มีการออกกำลังกาย		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	2.70	1.81	3.59	4.46	3.22	5.69	26.31	22.44	30.18	66.54	62.62	70.45
เชียงราย	2.72	1.70	3.74	5.04	3.07	7.00	42.89	35.15	50.63	49.35	40.27	58.43
เชียงใหม่	2.27	1.44	3.10	4.51	3.09	5.94	36.12	29.58	42.66	57.10	49.53	64.67
อุดรธานี	3.68	1.08	6.29	7.96	5.67	10.25	48.97	41.42	56.52	39.38	30.71	48.06
นครสวรรค์	0.50	0.06	0.94	1.23	0.27	2.19	15.71	7.61	23.80	82.56	73.75	91.38
ปทุมธานี	3.52	1.77	5.28	4.55	2.84	6.26	29.95	23.03	36.87	61.98	53.62	70.35
ฉะเชิงเทรา	1.43	0.55	2.31	3.76	2.34	5.17	31.21	22.86	39.56	63.60	53.74	73.46
สระแก้ว	0.82	0.37	1.27	3.11	1.95	4.26	17.60	10.88	24.32	78.47	71.03	85.91
สระบุรี	1.65	0.40	2.90	2.72	1.57	3.87	15.87	11.27	20.47	79.76	73.83	85.69
ราชบุรี	2.08	1.21	2.94	3.04	1.93	4.15	27.21	23.92	30.51	67.67	63.91	71.43
ประจวบคีรีขันธ์	2.40	1.43	3.36	3.70	2.34	5.05	40.47	32.73	48.21	53.44	45.20	61.68
บุรีรัมย์	2.82	1.42	4.23	6.17	3.79	8.55	36.74	27.55	45.94	54.26	43.23	65.29
อุบลราชธานี	2.63	1.42	3.84	5.63	3.90	7.36	37.30	30.29	44.30	54.45	46.47	62.43
ยโสธร	5.26	3.15	7.37	7.21	4.63	9.79	65.45	58.86	72.04	22.08	15.94	28.22
อุดรธานี	1.68	0.75	2.61	4.07	2.94	5.21	40.50	32.18	48.81	53.75	44.87	62.63
ร้อยเอ็ด	4.23	2.63	5.83	5.89	3.43	8.36	44.35	34.97	53.73	45.52	33.51	57.54
สุรินทร์	3.36	0.00	7.53	2.73	1.20	4.27	47.33	38.10	56.56	46.58	36.03	57.12
นครศรีธรรมราช	5.35	4.08	6.63	9.30	6.88	11.71	75.37	69.50	81.25	9.98	5.24	14.71
สตูล	0.11	0.00	0.33	0.44	0.11	0.77	18.23	9.37	27.08	81.22	72.32	90.12
ระนอง	2.02	1.13	2.92	2.77	1.90	3.64	32.88	26.68	39.08	62.32	54.93	69.71
ตรัง	3.83	2.60	5.06	7.30	5.17	9.42	36.37	30.56	42.18	52.51	45.43	59.58
ประเทศ	2.73	2.16	3.29	4.69	3.80	5.58	35.86	29.10	42.62	56.72	48.73	64.72

คำอธิบาย

1. กลุ่มผู้ไม่มีกิจกรรมทางกายอื่น หมายถึงผู้ทำงานประจำ งานปกติ และไม่มีการออกกำลังกายหรือไม่มีการออกกำลังกาย (inactive)
2. กลุ่มผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอื่นนอกเหนืองานประจำ หรือได้ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย แต่ยังไม่เพียงพอ (insufficiently active) หมายถึงได้ออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงปานกลางระหว่าง 0-149 นาทีต่อสัปดาห์ หรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงอย่างเบาหรือแรงน้อย
3. กลุ่มผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอื่นนอกเหนืองานประจำอย่างเพียงพอ หมายถึง ได้ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายอื่นอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ (active) คือ กิจกรรมทางกายที่ออกแรงปานกลางระหว่าง 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ หรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงหนัก ระหว่าง 75-150 นาทีต่อสัปดาห์
4. กลุ่มผู้ที่มีกิจกรรมทางกายอื่นนอกเหนืองานประจำอย่างเพียงพอที่เกิดผลดีต่อสุขภาพสูงตามเกณฑ์ขั้นสูง (highly active) หมายถึง ได้ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงปานกลางได้มากกว่า 300 นาทีต่อสัปดาห์ หรือมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงหนักมากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์

ตารางที่ 5 ค่าประมาณความชุกผู้มีความเครียดใน 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมินความเครียด ST-5)

จังหวัด	มีความเครียดน้อยหรือไม่มีความเครียดเลย			มีความเครียดปานกลาง			มีความเครียดมาก			มีความเครียดมากที่สุด		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	88.2	86.5	89.9	9.77	8.27	11.27	1.31	0.78	1.83	0.73	0.46	1.00
เชียงราย	95.4	93.4	97.4	3.63	1.84	5.43	0.52	0.18	0.85	0.42	0.06	0.77
เชียงใหม่	91.6	88.8	94.5	6.36	3.54	9.19	1.31	0.52	2.11	0.68	0.20	1.16
อุตรดิตถ์	93.7	89.3	98.2	5.31	0.98	9.63	0.63	0.15	1.11	0.32	0.00	0.64
นครสวรรค์	93.3	88.9	97.7	5.95	1.84	10.06	0.48	0.17	0.79	0.27	0.00	0.58
ปทุมธานี	92.8	89.9	95.6	5.93	3.28	8.58	0.90	0.24	1.55	0.41	0.04	0.79
ฉะเชิงเทรา	93.5	91.9	95.1	5.52	3.86	7.18	0.38	0.11	0.65	0.60	0.02	1.18
สระแก้ว	89.7	86.5	92.9	9.05	6.11	11.99	0.61	0.13	1.10	0.64	0.15	1.14
สระบุรี	90.9	88.1	93.7	8.23	5.49	10.97	0.60	0.15	1.05	0.30	0.06	0.54
ราชบุรี	80.9	75.9	85.9	16.33	11.42	21.25	1.42	0.65	2.19	1.35	0.79	1.91
ประจวบคีรีขันธ์	94.5	91.5	97.4	4.77	1.98	7.56	0.41	0.11	0.72	0.36	0.09	0.62
บุรีรัมย์	89.1	85.3	92.9	8.68	5.13	12.22	1.39	0.39	2.38	0.83	0.31	1.34
อุบลราชธานี	94.2	91.9	96.6	5.02	2.77	7.27	0.39	0.00	0.83	0.36	0.00	0.74
ยโสธร	92.5	89.7	95.3	6.35	3.95	8.75	0.77	0.35	1.19	0.38	0.07	0.70
อุดรธานี	91.3	88.3	94.3	7.24	4.50	9.99	0.83	0.41	1.25	0.64	0.20	1.08
ร้อยเอ็ด	92.6	90.2	95.0	6.03	4.06	8.00	0.43	0.13	0.73	0.89	0.23	1.56
สุรินทร์	91.3	86.6	96.0	7.00	3.87	10.13	0.86	0.11	1.62	0.85	0.00	2.24
นครศรีธรรมราช	95.5	94.3	96.7	4.34	3.13	5.55	0.07	0.00	0.17	0.09	0.00	0.23
สตูล	68.5	58.6	78.4	27.83	19.08	36.58	0.89	0.25	1.52	2.81	1.16	4.46
ระนอง	94.2	92.4	96.0	4.79	3.10	6.48	0.40	0.03	0.77	0.60	0.05	1.15
ตรัง	89.3	87.6	91.1	9.02	7.42	10.62	1.28	0.79	1.77	0.36	0.05	0.66
ประเทศ	91.2	89.9	92.5	7.43	6.32	8.54	0.80	0.62	0.98	0.60	0.47	0.73

ตารางที่ 6 ค่าประมาณความชุกผู้มีภาวะซึมเศร้าใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-79 ปี (แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q)

จังหวัด	ไม่มีภาวะซึมเศร้า			มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย			มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง			มีภาวะซึมเศร้าระดับมาก		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	93.06	91.40	94.72	6.54	4.84	8.23	0.30	0.15	0.46	0.10	0.01	0.19
เชียงใหม่	96.39	93.58	99.20	3.20	0.65	5.75	0.41	0.07	0.76	-	-	-
-เชียงใหม่	97.39	95.60	99.19	2.26	0.61	3.92	0.34	0.03	0.66	-	-	-
อุดรธานี	97.97	97.01	98.94	1.94	1.05	2.82	0.09	0.00	0.26	-	-	-
นครสวรรค์	97.99	96.38	99.59	1.54	0.37	2.72	0.36	0.00	0.74	0.11	0.00	0.32
ปทุมธานี	96.49	95.16	97.82	3.37	2.06	4.69	0.03	0.00	0.10	0.10	0.00	0.25
ฉะเชิงเทรา	98.01	96.88	99.14	1.93	0.85	3.02	0.06	0.00	0.16	-	-	-
สระแก้ว	95.69	93.78	97.60	4.05	2.17	5.93	0.15	0.02	0.28	0.11	0.00	0.29
สระบุรี	95.36	92.81	97.91	4.17	2.08	6.25	0.46	0.00	1.06	0.02	0.00	0.05
ราชบุรี	82.73	75.54	89.91	16.31	9.32	23.30	0.92	0.21	1.63	0.04	0.00	0.13
ประจวบคีรีขันธ์	97.07	94.52	99.62	2.81	0.33	5.28	0.04	0.00	0.12	0.08	0.00	0.20
บุรีรัมย์	93.96	89.21	98.71	5.46	0.92	10.00	0.53	0.00	1.07	0.05	0.00	0.11
อุบลราชธานี	98.21	97.16	99.26	1.64	0.60	2.67	0.13	0.00	0.27	0.03	0.00	0.07
ยโสธร	98.14	97.34	98.95	1.86	1.05	2.66	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี	97.47	96.20	98.74	2.26	1.04	3.49	0.21	0.00	0.42	0.05	0.00	0.12
ร้อยเอ็ด	97.28	95.89	98.66	2.32	1.12	3.52	0.32	0.00	0.75	0.08	0.00	0.23
สุรินทร์	96.97	94.79	99.16	2.81	0.71	4.92	0.21	0.00	0.43	-	-	-
นครศรีธรรมราช	97.38	96.47	98.28	2.51	1.63	3.39	0.11	0.00	0.24	-	-	-
สตูล	68.72	57.74	79.69	28.13	18.37	37.90	3.13	1.26	5.00	0.02	0.00	0.07
ระนอง	97.59	96.70	98.48	1.99	1.21	2.76	0.12	0.00	0.26	0.30	0.00	0.82
ตรัง	96.41	95.07	97.76	3.37	2.12	4.62	0.14	0.00	0.31	0.09	0.00	0.25
ประเทศ	95.39	94.08	96.71	4.26	3.02	5.49	0.29	0.18	0.40	0.06	0.03	0.08

ตารางที่ 7 ค่าประมาณความชุกโรคไม่ติดต่อสำคัญในประชากรอายุ 15-79 ปี

จังหวัด	โรคหลอดเลือดสมอง			โรคหัวใจขาดเลือด			โรคถุงลมโป่งพอง/ โรคหลอดลมอักเสบ			โรคโลหิตจาง/ โรคเลือดจาง			โรคไตวายเรื้อรัง			โรคซึมเศร้า		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	0.55	0.16	0.94	1.19	0.86	1.52	0.73	0.17	1.29	2.86	1.71	4.01	0.39	0.15	0.64	0.74	0.42	1.06
เชียงราย	0.48	0.14	0.81	0.76	0.31	1.20	0.68	0.38	0.98	0.99	0.48	1.50	0.43	0.14	0.72	0.40	0.13	0.67
เชียงใหม่	0.72	0.34	1.10	1.01	0.45	1.58	0.80	0.37	1.23	1.73	0.81	2.65	0.31	0.00	0.62	0.66	0.23	1.08
อุตรดิตถ์	0.53	0.22	0.85	0.71	0.28	1.14	0.28	0.00	0.60	0.94	0.40	1.48	0.39	0.06	0.72	0.53	0.22	0.83
นครสวรรค์	1.26	0.45	2.07	0.62	0.28	0.96	0.10	0.00	0.21	1.13	0.30	1.96	0.16	0.00	0.35	0.21	0.00	0.52
ปทุมธานี	0.67	0.30	1.03	0.51	0.22	0.81	0.21	0.03	0.39	0.68	0.26	1.10	0.32	0.09	0.55	0.47	0.09	0.85
ฉะเชิงเทรา	0.51	0.20	0.81	0.49	0.07	0.90	0.31	0.00	0.65	0.88	0.26	1.50	0.48	0.03	0.94	0.28	0.00	0.62
สระแก้ว	0.97	0.47	1.46	0.32	0.07	0.58	0.33	0.01	0.64	1.13	0.36	1.90	0.41	0.11	0.70	0.45	0.15	0.75
สระบุรี	0.47	0.07	0.88	0.05	0.00	0.11	0.13	0.00	0.28	0.40	0.00	0.86	0.55	0.09	1.00	0.13	0.00	0.25
ราชบุรี	0.68	0.29	1.07	1.00	0.54	1.46	0.30	0.06	0.53	2.19	1.42	2.95	0.56	0.07	1.06	0.20	0.00	0.40
ประจวบคีรีขันธ์	0.81	0.32	1.29	0.48	0.21	0.76	0.32	0.06	0.59	0.25	0.02	0.47	0.16	0.01	0.31	0.12	0.00	0.30
บุรีรัมย์	1.08	0.58	1.57	0.73	0.24	1.23	0.26	0.04	0.47	1.47	0.62	2.32	0.79	0.37	1.21	0.33	0.00	0.67
อุบลราชธานี	0.75	0.29	1.21	0.40	0.11	0.70	0.18	0.00	0.45	1.65	0.44	2.86	0.28	0.07	0.50	0.43	0.11	0.75
ยโสธร	0.84	0.44	1.24	1.20	0.50	1.89	0.30	0.01	0.59	2.38	1.32	3.43	1.48	0.71	2.24	0.50	0.18	0.82
อุดรธานี	0.73	0.34	1.11	0.49	0.12	0.87	0.06	0.00	0.15	1.27	0.65	1.90	0.44	0.22	0.65	0.66	0.26	1.05
ร้อยเอ็ด	0.66	0.20	1.13	0.97	0.41	1.52	0.36	0.00	0.85	2.59	1.01	4.17	0.44	0.07	0.81	0.26	0.00	0.57
สุรินทร์	1.02	0.37	1.67	1.34	0.40	2.28	0.46	0.12	0.81	2.33	1.40	3.25	0.41	0.06	0.77	0.72	0.09	1.34
นครศรีธรรมราช	0.38	0.10	0.65	1.36	0.24	2.49	0.04	0.00	0.09	0.37	0.01	0.73	0.28	0.00	0.71	0.29	0.00	0.69
สตูล	-	-	-	-	-	-	0.34	0.02	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระนอง	0.64	0.29	1.00	0.35	0.11	0.59	0.18	0.00	0.39	0.49	0.19	0.79	0.07	0.00	0.15	0.25	0.08	0.43
ตรัง	1.12	0.45	1.78	1.13	0.61	1.64	0.28	0.03	0.53	1.18	0.63	1.74	0.21	0.00	0.43	0.87	0.26	1.49
ประเทศ	0.69	0.55	0.82	0.80	0.65	0.94	0.36	0.24	0.48	1.43	1.15	1.72	0.40	0.33	0.47	0.45	0.37	0.52

ตารางที่ 7 (ต่อ)

จังหวัด	โรคตับแข็ง			โรคพิษสุราเรื้อรัง			โรคหอบหืด			โรคกระดูกพรุน			โรคข้อเสื่อม/รูมาตอยด์			โรคมะเร็ง		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	0.42	0.06	0.78	0.38	0.00	0.83	1.52	0.99	2.05	0.92	0.56	1.29	2.53	1.90	3.17	1.14	0.72	1.55
เชียงราย	0.16	0.00	0.35	0.06	0.00	0.17	0.51	0.20	0.82	0.41	0.12	0.71	1.21	0.61	1.82	0.60	0.15	1.05
เชียงใหม่	0.13	0.00	0.26	0.25	0.00	0.55	1.36	0.76	1.96	0.44	0.15	0.73	1.11	0.63	1.59	0.82	0.38	1.27
อุดรดิตถ์	-	-	-	0.31	0.05	0.58	1.32	0.82	1.82	1.43	0.00	3.27	3.08	1.07	5.10	0.78	0.35	1.21
นครสวรรค์	0.01	0.00	0.04	0.16	0.00	0.45	0.51	0.08	0.95	0.12	0.01	0.23	1.34	0.46	2.21	0.83	0.32	1.33
ปทุมธานี	0.06	0.00	0.15	0.00	0.00	0.01	1.32	0.53	2.10	0.40	0.12	0.68	0.86	0.48	1.25	0.16	0.01	0.31
ฉะเชิงเทรา	0.05	0.00	0.13	0.07	0.00	0.22	1.21	0.64	1.78	0.19	0.03	0.35	0.47	0.13	0.81	0.92	0.25	1.59
สระแก้ว	0.07	0.00	0.17	0.17	0.00	0.39	0.84	0.20	1.47	0.21	0.00	0.43	0.80	0.17	1.42	1.14	0.08	2.21
สระบุรี	0.08	0.00	0.25	0.15	0.00	0.37	0.44	0.06	0.83	0.33	0.00	0.69	0.89	0.36	1.41	1.15	0.70	1.61
ราชบุรี	0.11	0.00	0.26	0.28	0.00	0.73	2.40	1.23	3.57	0.60	0.13	1.06	2.23	1.49	2.98	1.40	0.83	1.98
ประจวบคีรีขันธ์	0.07	0.00	0.20	0.15	0.00	0.31	0.74	0.39	1.08	0.13	0.00	0.28	0.62	0.30	0.94	0.26	0.09	0.43
บุรีรัมย์	0.05	0.00	0.14	0.10	0.00	0.26	1.05	0.52	1.59	0.23	0.00	0.46	1.54	0.70	2.38	1.05	0.45	1.65
อุบลราชธานี	0.11	0.00	0.30	0.11	0.00	0.28	0.66	0.03	1.28	0.33	0.00	0.71	1.04	0.44	1.64	0.62	0.16	1.09
ยโสธร	0.36	0.07	0.65	-	-	-	1.04	0.46	1.61	0.76	0.26	1.26	2.65	1.31	3.98	1.15	0.40	1.89
อุดรธานี	0.28	0.04	0.51	0.18	0.00	0.38	0.27	0.06	0.48	0.19	0.00	0.39	1.58	0.46	2.70	0.44	0.09	0.79
ร้อยเอ็ด	0.37	0.02	0.73	0.21	0.00	0.54	1.08	0.22	1.95	0.05	0.00	0.16	0.96	0.33	1.60	1.51	0.60	2.42
สุรินทร์	0.10	0.00	0.27	0.18	0.00	0.38	0.98	0.35	1.61	0.33	0.04	0.62	1.16	0.40	1.92	0.95	0.33	1.58
นครศรีธรรมราช	-	-	-	-	-	-	2.58	1.19	3.96	0.75	0.00	1.56	1.54	0.66	2.41	0.58	0.00	1.16
สตูล	-	-	-	-	-	-	0.27	0.00	0.54	-	-	-	-	-	-	0.39	0.02	0.76
ระนอง	-	-	-	0.21	0.00	0.48	0.82	0.45	1.19	0.20	0.04	0.35	0.52	0.31	0.74	0.63	0.27	0.99
ตรัง	0.22	0.00	0.53	0.27	0.00	0.61	2.63	1.83	3.43	0.66	0.25	1.06	2.02	1.00	3.05	0.74	0.39	1.10
ประเทศ	0.15	0.08	0.22	0.16	0.11	0.21	1.23	0.99	1.47	0.46	0.34	0.58	1.41	1.16	1.66	0.81	0.66	0.97

ตารางที่ 8 ค่าประมาณความชุกของผู้สวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี

จังหวัด	ไม่เคยสวมเลย			สวมนานๆ ครั้ง			สวมบางครั้ง			สวมเกือบทุกครั้ง			สวมทุกครั้ง		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	11.39	8.96	13.82	7.90	6.33	9.47	20.36	16.66	24.06	8.49	6.69	10.29	51.86	48.04	55.68
เชียงใหม่	10.69	7.66	13.72	18.75	14.52	22.98	24.76	18.50	31.02	14.24	11.10	17.38	31.56	23.24	39.89
อุตรดิตถ์	11.64	8.91	14.37	14.32	11.79	16.85	21.67	18.07	25.26	20.93	17.81	24.05	31.44	26.81	36.06
นครสวรรค์	4.93	2.90	6.97	14.18	8.52	19.84	20.38	13.72	27.04	17.41	14.38	20.43	43.11	33.98	52.24
ปทุมธานี	8.82	5.59	12.04	12.28	9.40	15.15	12.28	9.40	15.15	26.32	17.83	34.80	24.35	16.89	31.81
ฉะเชิงเทรา	6.49	3.06	9.91	12.59	8.40	16.78	18.19	11.40	24.98	19.28	11.37	27.19	43.46	32.83	54.08
สระแก้ว	12.06	7.66	16.45	14.99	9.01	20.96	23.05	17.73	28.37	13.38	8.66	18.11	36.53	29.29	43.77
สระบุรี	6.56	4.38	8.75	25.53	15.66	35.39	27.39	21.86	32.91	17.11	12.40	21.81	23.41	16.75	30.08
ราชบุรี	7.53	4.37	10.69	8.44	5.39	11.49	11.73	8.93	14.53	22.80	15.26	30.34	49.50	39.52	59.49
ประจวบคีรีขันธ์	17.33	13.17	21.50	11.23	8.53	13.94	23.52	19.24	27.81	18.54	14.41	22.66	29.38	23.09	35.66
บุรีรัมย์	11.62	8.09	15.15	20.00	12.36	27.63	27.38	21.40	33.37	17.93	11.83	24.03	23.07	16.54	29.60
อุบลราชธานี	6.29	3.79	8.79	11.57	8.00	15.14	22.35	15.78	28.91	22.83	16.94	28.73	36.96	29.38	44.54
ยโสธร	4.91	3.15	6.68	13.50	9.56	17.44	26.02	20.51	31.52	21.54	15.95	27.14	34.03	27.22	40.83
อุดรธานี	9.30	5.21	13.38	13.18	8.93	17.44	31.77	25.88	37.67	16.42	12.48	20.37	29.32	22.48	36.17
ร้อยเอ็ด	4.91	3.06	6.75	9.33	6.48	12.18	29.47	23.05	35.89	17.43	13.55	21.32	38.86	30.93	46.79
สุรินทร์	6.40	3.72	9.09	13.98	10.90	17.06	25.03	18.34	31.72	19.02	15.47	22.57	35.57	28.55	42.58
นครศรีธรรมราช	4.67	2.98	6.36	11.03	6.61	15.44	29.0	21.7	36.3	25.9	19.5	32.4	29.37	20.02	38.72
สตูล	6.34	2.99	9.70	5.71	3.73	7.69	42.7	37.8	47.7	5.0	2.9	7.1	40.17	34.49	45.85
ระนอง	0.50	0.14	0.86	15.53	8.02	23.05	25.8	20.6	31.0	50.5	40.0	61.0	7.63	4.56	10.70
ตรัง	3.70	1.71	5.69	15.61	10.95	20.27	31.3	23.6	39.0	23.2	17.7	28.7	26.23	19.70	32.75
ประเทศ	9.10	6.80	11.40	15.3	12.0	18.6	21.5	16.3	26.7	19.2	15.6	22.7	34.95	30.51	39.38
ประเทศ	8.37	7.09	9.64	12.58	10.97	14.20	24.92	22.26	27.57	17.82	15.34	20.30	36.31	32.90	39.72

ตารางที่ 9 ค่าประมาณความชุกของผู้สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี

	ไม่เคยสวมเลย			สวมนานๆ ครั้ง			สวมบางครั้ง			สวมเกือบทุกครั้ง			สวมทุกครั้ง		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	21.17	17.40	24.95	8.45	7.08	9.83	21.42	19.11	23.72	6.30	5.14	7.47	42.65	39.07	46.22
เชียงใหม่	21.62	16.49	26.74	20.87	16.42	25.32	24.30	18.14	30.45	9.95	7.60	12.31	23.26	15.13	31.40
เชียงใหม่	24.45	18.32	30.58	15.46	11.90	19.02	19.41	15.30	23.51	17.09	13.49	20.68	23.59	19.26	27.92
อุดรธานี	9.76	6.17	13.34	13.65	9.70	17.61	21.18	15.07	27.28	19.18	14.76	23.61	36.23	28.32	44.14
นครสวรรค์	13.39	6.62	20.16	18.97	8.59	29.35	37.01	28.54	45.47	15.26	10.92	19.59	15.38	8.91	21.85
ปทุมธานี	21.44	15.44	27.45	18.79	14.27	23.30	18.81	12.61	25.02	20.24	9.98	30.50	20.72	14.32	27.12
ฉะเชิงเทรา	26.42	18.80	34.03	15.38	9.19	21.58	21.22	17.09	25.35	9.49	5.81	13.17	27.49	21.04	33.94
สระแก้ว	20.94	14.10	27.78	23.39	14.14	32.64	26.42	20.78	32.06	13.59	9.19	17.99	15.66	9.62	21.70
สระบุรี	11.89	7.84	15.94	10.11	7.16	13.06	15.58	10.89	20.26	24.35	17.79	30.91	38.07	28.64	47.50
ราชบุรี	39.40	33.03	45.76	12.32	10.77	13.87	23.33	19.86	26.79	12.75	9.49	16.01	12.21	9.68	14.74
ประจวบคีรีขันธ์	28.68	19.20	38.15	22.97	15.31	30.63	25.10	19.64	30.57	12.15	7.21	17.09	11.10	6.65	15.55
บุรีรัมย์	14.76	9.36	20.15	13.14	9.43	16.85	24.55	17.92	31.17	19.10	12.00	26.21	28.45	21.29	35.61
อุบลราชธานี	9.84	6.45	13.23	16.96	13.18	20.74	27.91	21.83	33.98	16.13	10.85	21.41	29.16	22.22	36.11
ยโสธร	16.39	11.16	21.62	14.42	9.43	19.42	32.83	27.14	38.52	13.04	9.32	16.76	23.32	17.82	28.81
อุดรธานี	11.08	6.50	15.67	9.94	6.71	13.17	31.81	24.78	38.84	16.76	12.43	21.10	30.40	22.42	38.39
ร้อยเอ็ด	11.74	7.75	15.73	15.04	11.90	18.18	26.99	19.32	34.65	14.79	10.20	19.38	31.45	23.67	39.22
สุรินทร์	15.02	9.50	20.53	12.93	8.49	17.38	34.46	25.89	43.04	16.04	11.29	20.80	21.54	13.15	29.94
นครศรีธรรมราช	13.13	8.67	17.60	10.73	8.44	13.02	44.17	38.92	49.43	3.27	1.75	4.80	28.68	22.40	34.97
สตูล	45.97	33.99	57.96	18.91	13.42	24.40	16.54	11.33	21.75	12.32	5.45	19.19	6.26	3.37	9.15
ระนอง	11.69	7.60	15.79	17.04	13.12	20.96	37.14	29.43	44.86	17.09	13.42	20.77	17.03	12.18	21.88
ตรัง	31.74	26.69	36.79	18.29	14.38	22.19	18.67	14.34	22.99	11.81	8.32	15.30	19.50	15.55	23.45
ประเทศ	19.27	16.51	22.04	14.67	13.00	16.34	26.04	22.99	29.09	13.63	11.46	15.80	26.39	23.06	29.71

ตารางที่ 10 ค่าประมาณความชุกผู้ติดเชื้อชนิดนรีภัยเมื่อเข้ารับถนตใน 12 เดือนที่ผ่านมในประชกรอายุ 15-79 ปี

	ไม่เคยคดเลย			คดนนๆ คร้ง			คดบงคร้ง			คดเกอบทุกคร้ง			คดทุกคร้ง		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	3.09	1.77	4.41	5.72	3.46	7.98	8.49	6.43	10.54	5.44	4.00	6.89	77.26	74.00	80.51
เชียงราย	5.39	2.17	8.61	10.70	5.80	15.60	15.67	8.68	22.67	12.76	8.77	16.74	55.48	44.56	66.39
เชียงใหม่	3.35	1.97	4.74	10.53	7.59	13.48	15.62	10.25	20.99	21.86	17.51	26.22	48.64	41.84	55.44
อุดรตดถ์	3.48	1.33	5.63	9.51	5.22	13.80	15.51	8.89	22.14	16.59	6.68	26.51	54.90	44.09	65.71
นครสวรรค์	4.65	2.72	6.59	14.68	10.72	18.63	30.19	24.15	36.22	19.30	14.25	24.35	31.19	20.95	41.42
ปทุมธานี	2.70	0.57	4.84	8.65	3.69	13.61	13.14	8.95	17.32	14.86	11.25	18.47	60.65	52.67	68.63
ฉะเชิงเทรา	4.76	1.52	7.99	12.18	6.08	18.27	13.61	7.83	19.39	14.76	9.14	20.38	54.70	45.43	63.97
สระแก้ว	5.25	3.45	7.06	23.37	10.05	36.69	21.89	15.93	27.86	15.12	9.45	20.78	34.37	25.17	43.58
สระบุรี	3.30	1.57	5.03	10.00	6.25	13.76	12.62	7.74	17.49	20.78	14.87	26.69	53.30	43.51	63.10
ราชบุรี	7.85	5.59	10.11	7.48	6.00	8.96	19.59	16.61	22.56	22.75	19.54	25.97	42.33	37.00	47.65
ประจวบคิรีขันธ์	7.94	5.24	10.65	19.86	10.62	29.10	22.17	15.11	29.23	16.29	11.36	21.22	33.74	25.10	42.37
บุรีรัมย์	2.83	1.11	4.55	7.28	4.30	10.26	9.65	5.48	13.83	26.51	19.28	33.73	53.73	44.12	63.34
อุบลราชธานี	2.26	1.07	3.45	12.10	7.71	16.48	17.00	11.38	22.63	15.88	7.43	24.33	52.76	41.94	63.58
ยโสธร	2.78	1.38	4.19	7.45	3.59	11.31	16.49	10.36	22.61	16.49	10.36	22.61	60.29	52.01	68.57
อุดรธานี	2.49	1.34	3.64	5.34	3.11	7.57	17.58	11.50	23.66	15.32	10.36	20.27	59.27	50.33	68.20
ร้อยเอ็ด	3.95	1.95	5.94	8.81	6.07	11.56	13.80	9.22	18.39	18.83	13.63	24.03	54.61	47.90	61.31
สุรินทร์	2.48	0.54	4.41	9.61	5.21	14.02	18.53	12.34	24.72	17.74	10.84	24.64	51.64	39.73	63.56
นครศรีธรรมราช	2.78	1.24	4.31	5.16	2.24	8.09	23.00	18.06	27.94	2.77	0.00	5.55	66.29	59.57	73.02
สตูล	1.61	1.00	2.22	14.99	10.72	19.26	27.27	20.64	33.89	41.73	32.84	50.62	14.41	9.18	19.64
ระนอง	2.71	1.49	3.94	10.28	5.36	15.21	22.68	16.77	28.59	20.81	15.44	26.18	43.52	36.64	50.40
ตรัง	7.30	4.82	9.79	13.75	10.23	17.28	16.95	11.98	21.92	12.25	9.40	15.11	49.74	43.59	55.89
ประเทศ	3.83	3.21	4.45	9.88	8.30	11.46	15.94	14.08	17.79	15.80	13.42	18.17	54.56	50.03	59.08

ตารางที่ 11 ค่าประมาณความชุกผู้คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อโดยสารรถยนต์ตอนหน้าคู่กับคนขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-79 ปี

	ไม่เคยคาดเลย			คาดนานๆ ครั้ง			คาดบางครั้ง			คาดเกือบทุกครั้ง			คาดทุกครั้ง		
	%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI		%	95%CI	
		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower		upper	lower
กรุงเทพมหานคร	6.42	5.13	7.70	5.38	3.50	7.25	10.83	9.26	12.40	6.37	5.08	7.67	71.01	67.82	74.19
เชียงใหม่	9.05	5.57	12.54	16.22	10.81	21.63	19.97	14.31	25.63	13.13	9.24	17.01	41.63	32.66	50.61
อุตรดิตถ์	6.05	4.53	7.56	10.74	8.03	13.44	19.65	15.17	24.12	19.17	14.80	23.53	44.40	38.74	50.06
นครสวรรค์	5.34	2.45	8.23	12.30	8.80	15.80	14.10	8.92	19.28	16.99	10.25	23.74	51.26	41.59	60.93
ปทุมธานี	6.42	2.65	10.19	19.36	10.84	27.89	33.64	22.94	44.33	15.70	11.71	19.70	24.87	14.80	34.94
ฉะเชิงเทรา	5.66	2.07	9.24	11.43	8.03	14.83	19.19	13.95	24.44	19.56	11.01	28.11	44.16	36.77	51.55
สระแก้ว	8.53	5.20	11.86	14.53	9.43	19.63	17.38	13.62	21.15	14.39	9.99	18.79	45.17	37.96	52.39
สระบุรี	7.10	5.53	8.67	16.80	9.65	23.95	22.17	17.36	26.99	17.26	12.93	21.60	36.66	28.92	44.41
ราชบุรี	4.29	2.34	6.23	12.80	7.52	18.07	13.84	9.65	18.04	19.23	13.66	24.80	49.84	39.91	59.78
ประจวบคีรีขันธ์	13.73	10.81	16.64	12.60	9.74	15.46	26.48	24.14	28.81	21.25	17.55	24.96	25.95	21.89	30.01
บุรีรัมย์	12.72	8.27	17.17	22.25	13.64	30.85	28.02	22.21	33.83	14.42	10.24	18.59	22.59	15.78	29.41
อุบลราชธานี	5.27	2.80	7.74	7.30	4.46	10.13	13.61	8.93	18.28	22.26	16.26	28.25	51.57	42.47	60.67
ยโสธร	3.54	1.90	5.17	14.27	9.82	18.72	20.34	14.15	26.53	15.19	8.95	21.43	46.67	36.63	56.71
อุดรธานี	3.81	2.40	5.23	6.59	3.56	9.63	18.23	12.82	23.65	11.30	7.85	14.75	60.06	51.22	68.90
ร้อยเอ็ด	2.56	1.02	4.09	5.22	3.21	7.24	22.26	13.55	30.97	13.37	9.41	17.32	56.60	46.83	66.36
สุรินทร์	4.22	2.25	6.18	9.35	6.79	11.91	18.06	12.57	23.54	14.05	9.36	18.73	54.33	48.14	60.52
นครศรีธรรมราช	5.38	2.63	8.13	10.05	5.86	14.24	21.30	12.96	29.63	16.79	12.10	21.49	46.48	34.75	58.20
สตูล	7.62	5.72	9.52	11.14	9.05	13.24	39.42	33.90	44.94	2.58	0.68	4.48	39.23	34.82	43.64
ระนอง	3.47	1.87	5.07	32.12	25.61	38.63	34.25	29.16	39.33	21.36	15.61	27.11	8.80	5.25	12.36
ตรัง	6.99	4.87	9.10	17.55	12.50	22.60	27.73	22.06	33.40	19.76	14.82	24.69	27.98	21.93	34.02
ประเทศ	10.65	7.78	13.53	16.77	12.29	21.25	16.85	13.19	20.51	13.89	10.37	17.41	41.84	34.99	48.68
ประเทศ	6.55	5.65	7.46	11.76	10.11	13.40	20.87	17.63	24.10	14.40	12.06	16.73	46.43	41.71	51.15

รายชื่อคณะทำงานโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561

คณะทำงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

1. นางสาวนพพร ศรีผัด	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
2. นายอำนาจ เมืองแก้ว	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
3. นายกอบโชค วุฒิชัยวิชยกิจ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
4. นางสาวธัญญ์ สุทธวงศ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
5. นายกวิน อินท่า	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
6. นางพรชนก สีหะวงษ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
7. นางสาวศุภิยา พลอยวงษ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
8. นางสาวกมลวรรณ คุ่มวงษ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
9. นางสาวจุฑาทิพย์ ชมพูนุช	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
10. นายอิสระพงศ์ เพลิดเพลิน	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
11. นางสาวจรรยา ภูักลั่น	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
12. นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
13. นางสาวกรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
14. นางสาวเพชรรัตน์ พันอัน	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
15. นางสาวนศินี ศรีสมบูรณ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
16. นายจักรี ศรีแสง	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
17. นางสาวรัษฎารินย์ ธนเศรษฐ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
18. นายมานะชัย สุระรัมย์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
19. นางสาวนศกรณีย์ สมหมาย	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
20. นางสาวพิทยา วามะขันธุ์	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
21. นางสาวจุติพร เกิดผล	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
22. นางสาวกรรณิกา สุวรรณา	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
23. นางสาวจิรา แก้วดำ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
24. นางพิตรียะห์ สาและ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
25. นางพัทนันท์ สุพรรณ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
26. นางนันทลักษณ์ ชันที	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
27. นายศุภฤกษ์ โนสุ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
28. นายประเสริฐ วันดี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

29. นางเรื่อนทอง	ใหม่อรินทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
30. นางอัจฉราวดี	เสนีย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
31. นายเจริญชัย	แป้นฝ้าย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
32. ดร.ยอดชาย	สุวรรณวงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
33. นางธัญรัตน์พร	หาญโสภี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
34. นางนงนุช	พงษ์เจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
35. นางสาวดวงเดือน	ก้อนทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
36. นางสาวนัชชา	ธีรวโรดม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
37. นางสาวดาวินา	ช่างทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
38. นางชนิสรา	จีบเจือ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39. นางสาวอัญชลี	สังข์เจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
40. นางสาวสุประภา	ยะรังษี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
41. นางภัทรา	ผาแก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
42. นายธนกฤต	นิธิตันติปัญญา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
43. นางสุภาภรณ์	ทัศนพงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
44. นางประภาศรี	ทุมะลา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
45. นางสาวจิรพันธ์	พิจารณาจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
46. นางประไพ	บัวคอม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
47. นางศิริรัตน์	โสศศิริ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
48. นางสาวสุดา	ราชอาษา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
49. นางคันสนีย์	ภัทรศรีวังชัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
50. นายคมกริช	ศรีชาดา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
51. นางสาวอลิษา	สุพรรณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
52. นางเยาวลักษณ์	โกศลทวีพงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
53. นางสาวศรี	มูลสาร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
54. นางสาวกขพร	จันทร์เสลด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
55. นางมณฑนา	เฮาตระกูล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
56. นางทิพวรรณ	แก้วบางพุด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
57. นางสาวเกณิกา	บุญจันทร์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
58. นางนพพร	เนียมอยู่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
59. นายสุทธิมาศ	บินสอาด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
60. นายประณต	มหาวิจิตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
61. นายศุภชาติ	เขมวฒิพงษ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
62. นางสมญา	ศิลปวิสุทธิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง



รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2561